
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium depressum

Armadillidium depressum



L’arrière élargi et la plaque frontale relevée aident à distinguer ce cloporte d’Armadillidium vulgare [S1].

Conglobation | Murs et pierres

TAILLE DOCUMENTÉE

Jusqu’à 20 mm

Longueur corporelle, synthèse BMIG [S1].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Murs et abris

Activité nocturne sur les murs documentée par BMIG [S1].

01 Installation et refuges

Litière ventilée

Antpire associe litière et bois décomposé, secteurs humides et plus secs ; aucun volume minimal validé [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D’ÉLEVEUR **18-24 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles, bois décomposé, compléments végétaux et protéiques, avec une source calcaire selon Antpire [S2].

04 L’humidité varie

Un gradient

Secteurs humides et plus secs, avec ventilation moyenne à forte selon Antpire [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Journal manuel des interventions · État du substrat et des aliments · Jeunes, mues et mortalités observés

Précisions & sources

Armadillidium depressum

Comprendre cette fiche

Reconnaître Armadillidium depressum, le cloporte des murs et abris pierreux, puis organiser sa litière, son humidité et le suivi discret des jeunes en élevage.

Ce cloporte peut évoquer A. vulgare, mais son arrière élargi et sa plaque frontale relevée donnent une silhouette différente. Les petits jeunes ont un dessin distinct de celui des adultes. [S1]

Origine

Le BMIG le décrit surtout dans des milieux liés aux activités humaines en Grande-Bretagne : murs, carrières, voies ferrées et bâtiments anciens. Cela ne constitue pas une carte complète de l'aire native. [S1]

Mode de vie

Les observations nocturnes peuvent révéler des animaux actifs sur les murs, alors qu'ils restent cachés sous les pierres pendant d'autres périodes. [S1]

Taille adulte

Jusqu'à 20 mm de longueur corporelle selon le BMIG. [S1]

Longévité

Longévité individuelle non établie par les documents retenus ; aucune valeur chiffrée n'est extrapolée.

Habitat complet

Antpire décrit un contenant bien ventilé avec litière et bois décomposé, associant secteurs humides et plus secs. Aucune dimension minimale expérimentale n'est publiée. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 18-24 °C chez Antpire [S2]

Valeur de pratique lorsqu'elle est attribuée à un éleveur ; aucun seuil de sécurité universel n'est déduit.

Humidité et ventilation : Gradient humide/sec et ventilation moyenne à importante, selon Antpire [S2]

Examiner le substrat sous les refuges et noter les conditions réelles du bac.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 18-24 °C

Repère Antpire, pas optimum expérimental [S2].

Portée de cette fiche

Identification et habitats BMIG ; conditions attribuées à un élevage commercial.

Confusions à éviter

L'extrémité du corps paraît plus évasée que chez A. vulgare ; les premiers pléopodes du mâle constituent un caractère de détermination spécialisé. [S1] Photographier sans forcer la fermeture du corps. Une identification à partir d'un jeune isolé mérite une réserve : son dessin ne reproduit pas simplement celui d'un adulte réduit.

Aménagement et ventilation

La préférence naturelle pour les murs ne signifie pas qu'un bac de pierres sèches suffit. L'éleveur associe abris et matière végétale décomposée. [S2] Choisir une disposition permettant de contrôler les refuges sans soulever une pile instable facilite l'entretien. Noter tout ajout d'aération, car il peut changer le rythme auquel le coin humide sèche.

Alimentation et calcium

Antpire propose feuilles, bois en décomposition, compléments végétaux et protéiques, avec une source calcaire telle que sépia ou calcaire. [S2] Distinguer dans le carnet les réserves de fond et les distributions ponctuelles. Si un complément reste longtemps visible, enregistrer cette observation avant de renouveler l'apport ; la quantité utile dépend de la consommation réellement constatée.

Humidité et température

Le maintien présenté repose sur des zones contrastées et l'absence d'eau stagnante. [S2] Pour suivre ce gradient, relever séparément l'état du refuge et celui de la surface exposée. Une paroi sèche ne prouve pas que la profondeur du substrat l'est aussi. L'observation sous la litière doit rester brève pour conserver le fonctionnement du refuge.

Reproduction et petits individus

Aucun nombre de jeunes ni calendrier de maturité n'est retenu. Avant un transfert, regarder également les fragments de litière et le dessous des écorces : les plus petits individus peuvent être peu visibles. Dater l'apparition de plusieurs classes de taille aide à suivre la colonie sans chercher à attribuer un âge précis à chaque animal.

Observer la nuit avec mesure

Les observations de terrain rendent une vérification ponctuelle en soirée pertinente, sans imposer une surveillance continue. [S1] Noter heure et éclairage permet de comparer les sorties. Une baisse d'activité observée à une autre heure n'est pas forcément une dégradation. Les recommandations d'Antpire restent une pratique commerciale, distincte de la description naturaliste.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver la provenance et l'identification du lot.

[ ] Préparer les ressources et refuges avant l'arrivée.

[ ] Définir un contrôle simple sans démontage régulier du milieu.

Précisions & sources

Armadillidium depressum

Sources consultées

[S1] British Myriapod and Isopod Group - Armadillidium depressum
https://bmig.org.uk/species/armadillidium-depressum
Consulté le 2026-10-24

[S2] Antpire - Armadillidium depressum, élevage déclaré
https://www.antpire.net/en/products/armadillidium-depressum
Consulté le 2026-10-24

Photographie et licence

Photo : Emanuele Santarelli · CC BY-SA 4.0
armadillidium-depressum.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-depressum/

Synthèse documentaire du 2026-10-24. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.