COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium nasatum

Armadillidium nasatum



Le prolongement frontal aide à reconnaître Armadillidium nasatum ; la couleur seule ne suffit pas à l'identifier [S1].

Museau saillant

Conglobation incomplète

TAILLE DOCUMENTÉE

Jusqu'à 12 mm

BMIG ; Insektenliebe annonce moins de 14 mm [S1][S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Sous les abris

Pierres, pots et débris dans les milieux décrits [S1].

01 Installation et refuges

Sol couvert

Humus, feuilles et bois feuillu décomposé, avec mousse et écorce dans la pratique d'Insektenliebe [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D'ÉLEVEUR **18-23 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles, légumes et aliment pour cloportes selon Insektenliebe ; apport calcaire mentionné par le guide de Mad Walshs [S2][S3].

04 L'humidité varie

Humidité localisée

Un refuge humide et une partie moins humide, dans la pratique commerciale citée [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Relevés manuels de température · État du refuge humide · Photos avec échelle · Observation des jeunes

Précisions & sources

Armadillidium nasatum

Comprendre cette fiche

Armadillidium nasatum se reconnaît à son petit museau frontal. Une fiche pour distinguer l'espèce, préparer sa litière et observer une colonie avec méthode.

Le petit prolongement de la tête explique le nom anglais de ce cloporte. Le BMIG le distingue notamment d'A. vulgare grâce à ce scutellum saillant. [S1]

Origine

Espèce présente dans une partie de l'Europe ; en Grande-Bretagne, elle occupe carrières, friches, voies ferrées et jardineries, avec des populations plus septentrionales associées aux serres. Ces données décrivent une répartition, pas un certificat d'origine de souche. [S1]

Mode de vie

Fréquente des abris sous pierres, pots et débris dans des milieux souvent ensoleillés. Lorsqu'il se roule, les antennes peuvent rester saillantes. [S1]

Taille adulte

Le BMIG indique jusqu'à 12 mm ; Insektenliebe annonce moins de 14 mm. Ces repères descriptifs distincts ne définissent pas une taille cible. [S1][S2]

Longévité

Non quantifiée ici : les sources retenues ne fournissent pas de suivi individuel exploitable.

Habitat complet

Un sol contenant humus, bois feuillu décomposé et feuilles, complété de mousse et d'écorce, est décrit par Insektenliebe ; conserver un secteur moins humide. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 18-23 °C dans la fiche d'Insektenliebe [S2]

Plage de pratique commerciale ; vérifier les conditions effectives de la souche.

Eau du substrat : Humidité localisée et choix d'une zone plus sèche [S2]

La présence naturelle en milieu sec ne signifie pas que tout le sol peut sécher.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 18-23 °C

Repère commercial Insektenliebe, pas optimum démontré [S2].

Portée de cette fiche

Morphologie BMIG prioritaire sur une contradiction de la page commerciale ; pas de longévité ni de fécondité extrapolée.

Le museau compte davantage que la couleur

Le corps présente souvent des bandes longitudinales claires, mais des formes foncées ou colorées existent. Le caractère frontal et la fermeture imparfaite sont plus informatifs. [S1] La page commerciale affirme une fermeture complète : sur ce point, cette fiche retient explicitement la description spécialisée du BMIG. [S1][S2] Une photo nette de la tête doit accompagner une identification incertaine.

Construire un habitat observable

Installer plusieurs cachettes accessibles sans déplacer toute la litière. Le mélange terre, feuilles et bois décrit dans la source d'élevage fournit une structure et une nourriture de fond. [S2] Pour rendre l'entretien reproductible, noter le matériau de départ, le niveau du substrat et l'emplacement des aérations. Il sera alors possible de relier un changement de séchage à une modification précise de la boîte.

Feuilles, compléments et calcium

L'éleveur propose feuilles, légumes et aliment pour cloportes. [S2] La fiche générale de Mad Walshs, qui inclut expressément A. nasatum, associe également matière végétale décomposée et apport calcaire. [S3] Les compléments peuvent être suivis sur un emplacement dédié : inscrire date, quantité approximative et restes aide à ajuster les apports sans multiplier les changements simultanés.

Interpréter le climat

Le BMIG décrit des habitats ouverts et fortement éclairés, mais les animaux sont recherchés sous les objets qui leur servent d'abri. [S1] Il serait trompeur de transformer cette observation en consigne de placer une boîte au soleil. Contrôler séparément température de la boîte et humidité du refuge donne deux informations différentes ; aucune valeur d'hygrométrie de l'air universelle n'est retenue.

Observer la reproduction

La recherche utilisée ne justifie ni délai fixe de maturation ni nombre garanti de jeunes. Photographier régulièrement une même zone, avec une référence d'échelle extérieure, peut documenter l'apparition de petites classes de taille. Ne pas attribuer un âge exact à un animal à partir de sa seule longueur ; l'objectif est de suivre une tendance, sans provoquer de reproduction par une hausse improvisée du chauffage.

Précisions & sources

Armadillidium nasatum

Risques et contrôle quotidien

Inspecter les restes alimentaires et noter si les animaux sont visibles sous les mêmes abris. Une présence réduite en surface ne prouve pas une mortalité. Lors d'un transfert, conserver la séparation entre provenance, morphologie observée et éventuel nom de morphe. La diffusion horticole documentée par le BMIG rappelle aussi pourquoi une colonie ne doit pas être dispersée avec de la terre ou des plantes. [S1]

Références françaises : Armadillidium nasatum

Référence retrouvée dans les catalogues français suivants : Isopodshop [S4] ; Insectorus [S6]. La présence en catalogue, y compris en rupture, ne mesure pas les ventes.

Isopodshop propose 18-25 °C pour le maintien. C'est un repère commercial, pas une plage de sécurité démontrée. [S4]

Insectorus indique 18-26°C. Cette plage commerciale ne démontre pas des seuils de sécurité. [S6]

Insectorus annonce 1.5-2cm à l'âge adulte, sans méthode de mesure explicitée. [S6]

Les chiffres de ces vendeurs restent attribués séparément : leur réunion ne constitue pas une nouvelle plage de maintien validée.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Documenter le museau frontal.

[ ] Préparer des refuges sur les deux zones.

[ ] Conserver provenance et nom de sélection séparément.

Sources consultées

[S1] British Myriapod and Isopod Group - armadillidium nasatum
https://bmig.org.uk/species/armadillidium-nasatum
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Armadillidium nasatum
https://insektenliebe.com/de/shop/produkt/armadillidium-nasatum/
Consulté le 2026-10-24

[S3] Mad Walshs - General Isopod Care Sheet, espèces expressément couvertes
https://madwalshs.blog/general-isopod-care-sheet/
Consulté le 2026-10-24

[S4] Armadillidium nasatum - Isopodshop
https://isopodshop.fr/products/armadillidium-nasatum
Consulté le 2026-10-29

[S5] World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database - Armadillidium nasatum
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=257751
Consulté le 2026-10-29

[S6] Armadillidium nasatum - Insectorus
https://insectorus.fr/products/armadillidium-nasatum-lots-de-10
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Gilles San Martin · CC BY-SA 4.0
armadillidium-nasatum.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-nasatum/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.