COMPRENDRE SON ESPÈCE

Armadillidium peraccae

Armadillidium peraccae



Espèce distincte du groupe d’Armadillidium nasatum, documentée du sud-est italien au nord de l’Égée et à la mer de Marmara [S1].

Méditerranée orientale | Litière

TAILLE DOCUMENTÉE

Mesures divergentes

Insektenliebe : moins de 18 mm ou 15-20 mm [S2].

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle étayée dans les sources retenues.

MODE DE VIE

Parmi les abris

Activité visible en surface rapportée par l’éleveur [S2].

01 Installation et refuges

Humus et feuilles

Humus, feuilles et bois blanc décomposé dans la pratique citée ; prévoir des abris observables [S2].

02 Température & lumière

REPÈRE D’ÉLEVEUR **20-26 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles et bois en base, compléments mesurés et calcium selon Insektenliebe ; Bog Beafts mentionne calcium et légumes [S2][S3].

04 L’humidité varie

Refuge localisé

Refuge légèrement humide et autres secteurs moins humides, sans saturation [S2].

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Journal manuel des interventions · État du substrat et des aliments · Jeunes, mues et mortalités observés

Précisions & sources

Armadillidium peraccae

Comprendre cette fiche

Armadillidium peraccae : origine méditerranéenne, substrat nourricier, refuge humide et suivi des jeunes, avec une séparation claire entre observations et élevage.

Armadillidium peraccae est maintenu ici comme une espèce distincte. Une publication spécialisée le distingue des espèces voisines du groupe d'A. nasatum. [S1]

Origine

Côtes du sud-est de l'Italie, îles du nord de l'Égée et mer de Marmara dans la synthèse de Schmalfuss. [S1]

Mode de vie

Le fournisseur décrit une espèce active, parfois visible en surface, dans des installations riches en abris. Cette observation ne garantit pas une activité diurne constante. [S2]

Taille adulte

Insektenliebe publie moins de 18 mm dans son tableau mais environ 15-20 mm dans son texte ; ce désaccord reste visible. [S2]

Longévité

Longévité individuelle non établie par les documents retenus ; aucune valeur chiffrée n'est extrapolée.

Habitat complet

Litière épaisse sur humus et bois feuillu décomposé, abris d'écorce et mousse ; un angle reste humide. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 20-26 °C dans la pratique d'Insektenliebe [S2]

Valeur de pratique lorsqu'elle est attribuée à un éleveur ; aucun seuil de sécurité universel n'est déduit.

Humidité et ventilation : Refuge légèrement humide, autres secteurs moins humides, sans saturation [S2]

Examiner le substrat sous les refuges et noter les conditions réelles du bac.

Repères de la première page

REPÈRE D'ÉLEVEUR : 20-26 °C

Pratique Insektenliebe, pas intervalle de sécurité validé [S2].

Portée de cette fiche

Synthèse taxonomique et deux élevages ; taille commerciale contradictoire signalée.

Conserver une identité lisible

La proximité entre espèces apparentées ne permet pas de réutiliser n'importe quelle étiquette ancienne. Le triangle frontal allongé participe aux caractères du groupe, sans être à lui seul une clé complète. [S1] Demander une détermination documentée lorsqu'un lot porte un nom hésitant, et conserver la réserve dans le registre plutôt que la supprimer.

Installer avant de recevoir les animaux

Le fournisseur propose un substrat associant humus, feuilles et bois blanc décomposé. [S2] Préparer la boîte assez tôt pour vérifier comment elle retient l'eau. Une photographie d'ensemble et quelques notes sur les matériaux facilitent ensuite la comparaison ; elles permettent aussi de décrire exactement l'installation à une personne sollicitée pour un conseil.

Ressources alimentaires

La page d'élevage prévoit feuilles et bois comme base, des compléments en petites quantités et une source de calcium. [S2] Bog Beafts signale également calcium et légumes dans sa culture. [S3] Consigner les apports sur une zone accessible réduit l'incertitude sur les restes. Le poids d'un emballage commercial ne doit jamais devenir un poids adulte dans le carnet.

Gérer le gradient

L'humidité locale est plus informative qu'un mot comme « méditerranéen ». Le retour d'élevage garde une zone disponible pour l'hydratation. [S2] Décrire l'état du sol avec des observations simples et répétables, puis noter l'arrosage effectué. Éviter de changer à la fois substrat, ventilation et température lorsque l'on veut comprendre l'origine d'une modification de comportement.

Suivre les naissances

L'éleveur annonce une reproduction régulière dans ses conditions, sans série contrôlée permettant de prédire le rendement d'une autre colonie. [S2] Noter les jeunes effectivement visibles et les classes de taille successives. Un lot reçu contenant déjà plusieurs générations ne permet pas d'attribuer toutes les naissances aux nouvelles conditions de maintien.

Limites et traçabilité

La divergence de taille sur une même page illustre la nécessité de qualifier les chiffres. La présence de l'espèce sur une liste de vente ne démontre pas non plus la provenance d'un lot donné. Conserver factures ou notes de transmission, photos et dates de séparation des cultures permet de suivre l'identité sans prétendre certifier leur histoire.

Précisions & sources

Armadillidium peraccae

Références françaises : Armadillidium peraccae

Référence retrouvée dans les catalogues français suivants : Isopodshop [S4] ; Insectorus [S6]. La présence en catalogue, y compris en rupture, ne mesure pas les ventes.

Isopodshop propose 18-26 °C pour le maintien. C’est un repère commercial, pas une plage de sécurité démontrée. [S4]

Insectorus indique 18-25°C. Cette plage commerciale ne démontre pas des seuils de sécurité. [S6]

Insectorus annonce 2cm à l’âge adulte, sans méthode de mesure explicitée. [S6]

Les chiffres de ces vendeurs restent attribués séparément : leur réunion ne constitue pas une nouvelle plage de maintien validée.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver la provenance et l’identification du lot.

[ ] Préparer les ressources et refuges avant l’arrivée.

[ ] Définir un contrôle simple sans démontage régulier du milieu.

Sources consultées

[S1] Schmalfuss (2013) - The species of the genus Armadillidium known from Greece, transcription du texte
https://paperzz.com/doc/7885625/armadillidium
Consulté le 2026-10-24

[S2] Insektenliebe - Armadillidium peraccae
https://insektenliebe.com/en/shop/product/armadillidium-peraccae/
Consulté le 2026-10-24

[S3] Bog Beafts - Care guides, Armadillidium peraccae
https://www.bogbeafts.studio/careguides.html
Consulté le 2026-10-24

[S4] Armadillidium peraccae - Isopodshop
https://isopodshop.fr/products/armadillidium-peraccae
Consulté le 2026-10-29

[S5] World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database - Armadillidium peraccae
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=257773
Consulté le 2026-10-29

[S6] Armadillidium peraccae - Insectorus
https://insectorus.fr/products/sans-titre-2juin_10-31
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Elia Lo Parrino · CC BY 4.0
armadillidium-peraccae.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/armadillidium-peraccae/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.