COMPRENDRE SON ESPÈCE



Correlophus sarasinorum

Correlophus sarasinorum

Gecko nocturne du sud de la Nouvelle-Calédonie, lié aux formations forestières fermées [S1][S4].

Arboricole · Nocturne

TAILLE ADULTE	ACTIVITÉ	RÉGIME
25-28 cm	**Nocturne**	**Omnivore**
Longueur totale, queue comprise [S2].	Arboricole [S2].	Proies et composante fruitée [S2].

01 Aménager son habitat

Grand volume vertical

Minima divergents entre guides ; prévoir branches et retraits [S2][S3].

02 Température & lumière

JOUR · PÉRIODE CHAUDE	**26-29 °C [S2]**
NUIT · PÉRIODE CHAUDE	**22-24 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Alimentation omnivore adaptée, avec observation de la consommation et de la condition corporelle [S2].

04 L’humidité varie

Cycle jour-nuit

IGA : environ 60 % le jour, 80-90 % la nuit ; ventiler [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Gecko géant de Sarasin

Comprendre cette fiche

Identifier le gecko géant de Sarasin, organiser ses refuges, suivre repas et humidité et comprendre les limites des recommandations de reproduction.

Correlophus sarasinorum est un gecko forestier du sud néocalédonien. Son ancien nom Rhacodactylus sarasinorum reste fréquent dans les documents d'élevage [S1][S2].

Origine

Extrême sud de Grande Terre, en Province Sud de Nouvelle-Calédonie ; populations dispersées dans des fragments forestiers [S4].

Habitat complet

Les minima divergent : IGA 40 × 40 × 60 cm, Reptile Supply environ 61 × 61 × 122 cm pour un individu. Cette fiche privilégie l'organisation d'un grand volume vertical [S2][S3].

Paramètres et méthode de mesure

Jour en période chaude : 26-29 °C [S2]

Repère saisonnier IGA ; conserver des retraits plus frais.

Nuit en période chaude : 22-24 °C [S2]

Valeurs saisonnières, pas une consigne annuelle fixe.

Humidité : ≈ 60 % jour ; 80-90 % nuit [S2]

Cycle d'élevage décrit par l'IGA ; contrôler ventilation et séchage des surfaces.

Repères de la première page

JOUR · PÉRIODE CHAUDE : 26-29 °C

Repère saisonnier IGA [S2].

NUIT · PÉRIODE CHAUDE : 22-24 °C

Repère saisonnier, pas annuel [S2].

Taxonomie et apparence

La base taxonomique et l'IGA confirment la combinaison actuelle Correlophus sarasinorum [S1][S2]. Les formes à taches ou collier blancs et les individus moins dessinés ne sont pas présentés comme des espèces distinctes. Un nom commercial doit donc rester attaché à la description de l'animal, sans devenir un synonyme scientifique. Conserver une photographie datée de la tête, du dos et de la queue aide à éviter les erreurs d'identification entre documents.

Taille adulte, longévité et mode de vie

25-28 cm de longueur totale selon l'IGA ; cette longueur inclut la queue [S2].

15-20 ans annoncés par Reptile Supply comme estimation captive ; aucun registre de longévité individuel n'est fourni [S3].

Nocturne et arboricole ; la robe peut être peu marquée ou porter des taches et un collier clairs [S2].

Habitat naturel fragmenté

Endemia situe les populations dans l'extrême sud de Grande Terre, entre des fragments de forêt fermée. L'évaluation citée souligne l'effet des incendies, activités minières et ongulés introduits sur ces habitats [S4]. Cette information ne se traduit pas par une recette de substrat minéral à copier. En captivité, les fonctions recherchées sont des appuis, du couvert et des refuges ; la ressemblance décorative avec un paysage ne prouve pas que ces fonctions sont présentes.

Choisir le logement en connaissance des divergences

Les deux sources pratiques ne proposent pas le même minimum [S2][S3]. Plutôt que présenter une moyenne arbitraire comme consensus, cette fiche conserve leurs références. Le choix éditorial est d'anticiper un volume généreux, dont la partie haute peut recevoir des abris et un poste alimentaire. Vérifier les trajets entre ces éléments et l'accès pour l'entretien. Une seule branche supérieure peut devenir un passage obligé, même dans une enceinte de grandes dimensions.

Climat saisonnier et points de mesure

L'IGA décrit un cycle saisonnier ; les valeurs de période chaude indiquées ici ne doivent pas être maintenues toute l'année par défaut. Elle signale aussi les problèmes associés à des températures durablement supérieures à 30 °C [S2]. L'interprétation exige de savoir où l'on mesure. Conserver séparément l'air près d'un refuge, le support éclairé et les conditions nocturnes permet de ne pas confondre un petit secteur chaud avec le climat de l'ensemble du terrarium.

Eau et ventilation

Les variations hygrométriques décrites accompagnent la pulvérisation et l'activité nocturne [S2]. Reptile Supply prévoit également un accès à l'eau dans un récipient placé en hauteur [S3]. Pour l'entretien, vérifier qu'il est stable et que les aliments ne tombent pas dedans. Un refuge sombre doit pouvoir rester utilisable après l'arrosage. Photographier ponctuellement l'état du décor avant et après séchage apporte une information que le seul maximum enregistré par un hygromètre ne restitue pas.

Repas et état corporel

Les pratiques décrites associent insectes et préparations pour geckos omnivores [S2][S3]. L'IGA attire l'attention sur la voracité et la prise de poids [S2]. Un bon suivi distingue donc l'appétit de la quantité distribuée. Noter les restes et les proies encore présentes, ainsi que la composition de l'aliment complet, aide à ajuster un plan avec une personne compétente. Aucun pourcentage de ration, poids cible ou supplémentation chiffrée n'est déduit d'un animal photographié.

Précisions & sources

Gecko géant de Sarasin

Comportement et reproduction

L’oviparité est confirmée taxonomiquement [S1]. L’IGA décrit des pontes d’un ou deux œufs enfouis dans un emplacement abrité, mais aussi des conflits parfois graves entre reproducteurs [S2]. La présence d’un mâle et d’une femelle ne garantit donc pas un couple compatible. Le choix prudent pour un projet sans reproduction est individuel. Si une ponte apparaît, documenter son emplacement et l’état de la femelle ; un calendrier d’élevage ne remplace pas une appréciation de sa condition.

Suivi et limites utiles

Comparer des observations obtenues à des horaires semblables est particulièrement utile pour cet animal nocturne. Une absence de mouvement à midi n’a pas la même signification qu’un changement durable d’activité au moment habituel des repas. Les sources consultées ne fournissent pas de série robuste sur la durée de vie ni de besoin nutritionnel expérimental complet [S2][S3]. La fiche laisse ces limites visibles et conserve les différences entre sources plutôt que de produire un protocole prétendument certain.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer plusieurs refuges accessibles avant l’arrivée.

[ ] Vérifier les mesures aux emplacements réellement fréquentés.

[ ] Conserver l’origine et les observations individuelles.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Correlophus sarasinorum
https://reptile-database.reptarium.cz/Correlophus/sarasinorum
Consulté le 2026-10-26

[S2] Andrea Vaccari et Emanuele Scanarini, IGA - Correlophus sarasinorum
https://italiangekko.net/ig/schede-allevamento/item/7350-scheda-allevamento-correlophus-sarasinorum-roux-1913
Consulté le 2026-10-26

[S3] Reptile Supply - How to Care for Your Sarasinorum Gecko
https://reptilesupply.com/blogs/care-sheets/how-to-care-for-your-sarasinorum-gecko
Consulté le 2026-10-26

[S4] Endemia - Correlophus sarasinorum
https://endemia.nc/faune/fiche1025.html
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Lennart Hudel · CC BY 4.0
Correlophus sarasinorum 40424064.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Peut-on faire cohabiter des reptiles dans le même terrarium ?

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/correlophus-sarasinorum/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.