

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent mangeur d’œufs

Dasypeltis scabra

Afrique subsaharienne, avec des populations notamment en Afrique du Sud et en Namibie. Les anciennes cartes du complexe ne doivent pas être reprises sans examen. [S1][S2] Se déplace au sol et grimpe sur pierres ou arbres pour accéder notamment aux nids. [S3]

Œufs uniquement

Identité à vérifier

TAILLE

≈ 60-100 cm

Guide ; convention non précisée [S4].

LONGÉVITÉ

Non établie ici

Pas de record suffisamment vérifiable.

MODE DE VIE

Sol et branches

Accès aux nids [S3].

01 Repère spécialisé

90 × 45 × 60 cm

Un adulte, avec couvert et appuis [S4].

02 Température & lumière

CHAUFFE	**30-32 °C [S4]**
FRAIS	**22-24 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Approvisionnement à sécuriser avant l’achat [S4].

04 L’humidité varie

40-60 %

Repère d’air spécialisé ; refuge humide localisé [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Œufs acceptés · Poids · Mues · Comportement

Précisions & sources

Serpent mangeur d’œufs

Comprendre cette fiche

Serpent mangeur d’œufs : identité, alimentation spécialisée, parcours de grimpe et reproduction, avec une attention aux jeunes et aux limites des sources.

Dasypeltis scabra est spécialisé dans la consommation d’œufs d’oiseaux. Sa petite tête et son corps mince ne rendent pas son entretien automatiquement simple : l’approvisionnement en œufs adaptés doit être résolu avant l’achat. [S3][S4] L’identité mérite également une vérification, car plusieurs espèces ont longtemps été regroupées sous ce nom.

Origine

Afrique subsaharienne, avec des populations notamment en Afrique du Sud et en Namibie. Les anciennes cartes du complexe ne doivent pas être reprises sans examen. [S1][S2]

Habitat complet

Herpeton propose au moins 90 × 45 × 60 cm pour un adulte, avec couvert et parcours de grimpe ; adapter au gabarit et au comportement. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 30-32 °C selon Herpeton [S4]

Valeur localisée sur un appui, non température uniforme du bac.

Refuge frais : 22-24 °C selon Herpeton [S4]

Contrôler l’accès réel au refuge.

Humidité de l’air : 40-60 % selon Herpeton [S4]

Prévoir une option humide localisée sans saturer tout le sol.

Repères de la première page

CHAUFFE : 30-32 °C

Herpeton [S4].

FRAIS : 22-24 °C

Herpeton [S4].

Le nom et ses limites actuelles

Coluber scaber, Anodon typus et Rachiodon scaber figurent parmi les anciennes appellations de l’espèce. [S1] En revanche, un vieux nom associé à un lot ne suffit pas à confirmer son identité aujourd’hui. La provenance, des photographies exploitables et l’historique du vendeur doivent être conservés. Ne pas corriger silencieusement une étiquette : une identification incertaine doit rester visible, surtout avant de transférer des données de reproduction ou de climat.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Herpeton indique généralement 60-100 cm chez l’adulte, sans expliciter la convention de mesure ; ce repère n’est pas présenté comme une mesure museau-cloaque ni un maximum documenté. [S4]

Aucune série ou longévité maximale vérifiable n’est retenue ici. Les durées annoncées dans des guides de maintien ne sont pas assimilées à des records établis.

Se déplace au sol et grimpe sur pierres ou arbres pour accéder notamment aux nids. [S3]

Pourquoi la couleur seule ne suffit pas

L’étude de Bates publiée en 2023 compare 153 spécimens namibiens et confirme la distinction entre D. scabra et D. loveridgei à partir de plusieurs caractères, notamment dessins et écaillure de la tête. [S2] Le travail porte sur des spécimens examinés, pas sur une ressemblance commerciale. Une photo dorsale isolée ne reproduit pas cet examen. Elle doit être complétée par la provenance et, en cas de doute, par l’avis d’une personne compétente sur ce groupe.

Avaler un œuf, rejeter sa coquille

Le zoo de Skærup explique que l’œuf est avalé entier, puis ouvert à l’intérieur ; son contenu poursuit son trajet tandis que la coquille est rejetée. [S3] Ce mécanisme normal ne doit pas être confondu automatiquement avec le rejet d’un repas pathologique chez un autre serpent. Observer à distance et décrire ce qui a été rejeté est plus utile que manipuler l’animal pour vérifier. Un rejet inhabituel ou répété doit néanmoins être signalé au vétérinaire.

Assurer les repas avant l’acquisition

Le guide Herpeton insiste sur des œufs frais, non fécondés et adaptés à l’animal ; les petits individus peuvent nécessiter des œufs de très petits oiseaux. [S4] Vérifier leur disponibilité régulière, leur provenance et les tailles effectivement acceptées par le serpent proposé. L’accès occasionnel à des œufs de caille ne résout pas forcément l’alimentation d’un jeune. Demander une preuve de repas récents et prévoir une solution durable avant de réserver l’animal.

Organiser le couvert et la hauteur

La capacité de grimpe est décrite par le zoo. [S3] Dans le terrarium, relier les appuis et conserver des retraits protégés aide à proposer un parcours plutôt qu’une branche exposée au milieu du vide. Les ouvertures de décor doivent être vérifiées à la taille du corps. Une imitation de nid n’est utile que si elle reste accessible au nettoyage et ne crée pas de bord coupant ou de recoin où un œuf cassé pourrait s’accumuler.

Précisions & sources

Serpent mangeur d’œufs

Climat et entretien mesurables

Les températures et l’humidité affichées sont des recommandations spécialisées attribuées, pas un optimum mesuré pour toutes les provenances. [S4] Contrôler séparément appui chauffé, refuge et air ; protéger et thermostater le chauffage. Prévoir comment enlever un œuf renversé sans tout démonter. L’observation du substrat complète l’hygromètre : une mesure d’air ne dit pas si un recoin reste continuellement mouillé. Conserver un accès aux différents refuges facilite également le contrôle des mues.

Reproduction : prévoir aussi les œufs nourriciers

L’espèce pond des œufs. [S1] Le zoo mentionne des pontes estivales, mais ne fournit pas de protocole d’incubation utilisable pour chaque provenance. [S3] Une reproduction captive exige donc davantage qu’une mise en couple : il faut prévoir des jeunes capables de trouver des aliments à leur taille, parfois difficiles à obtenir. Aucun refroidissement, rendement annuel ou calendrier d’éclosion n’est proposé ici. L’approvisionnement des descendants doit être organisé avant le projet reproductif.

Réagir à un refus sans improviser

Un refus isolé ne permet pas de choisir entre aliment inadapté, changement d’environnement ou problème de santé. Conserver la taille et l’origine des œufs proposés, les prises réellement observées et une courbe de poids comparable aide à préparer une consultation. Ne pas transformer la bouche en accès de nourrissage forcé à domicile. Demander une origine captive documentée, sans prélèvement ni relâcher, et vérifier les obligations applicables avant l’acquisition.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier les œufs disponibles.

[ ] Demander les derniers repas observés.

[ ] Conserver provenance et identité.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Dasypeltis scabra
https://reptile-database.reptarium.cz/Dasypeltis/scabra
Consulté le 2026-10-26

[S2] Bates (2023) - The enigmatic Namibian egg-eating snake Dasypeltis loveridgei: a valid species recovered from synonymy
https://zoologicalbulletin.de/BzB_Volumes/BzB_72_2/163_bates_20230808.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] Skærup Zoo - Æg spisende slange, Dasypeltis scabra
https://skaerup-zoo.dk/dyrene-i-parken/krybdyr/aeg-spisende-slange
Consulté le 2026-10-26

[S4] Herpeton Academy - Rhombic Egg-Eater
https://academy.herpeton.net/en/caresheets/snakes/dasypeltis-scabra/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Holger Krisp · CC BY 3.0
Eierschlange Dasypeltis scabra.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Suivi du poids d’un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Quarantaine d’un nouveau reptile : préparer l’accueil et le suivi

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/dasypeltis-scabra/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.