COMPRENDRE SON ESPÈCE

Dendrobate teint

Dendrobates tinctorius



Forêts de basse altitude du plateau des Guyanes et régions brésiliennes voisines. [S1] Diurne, elle utilise le sol et des surfaces en hauteur. [S4][S5]

Diurne · Insectivore

TAILLE ADULTE

4-5 cm

Longueur indiquée par le MNHN. [S2]

LONGÉVITÉ

Jusqu’à 15 ans

Durée possible en captivité, pas une moyenne. [S2]

MODE DE VIE

Diurne

Diurne, au sol et dans les microhabitats forestiers. [S4][S5]

01 Un vivarium forestier

Planté et drainé

Chicago cite 61 × 31 × 41 cm dans sa notice collective ; davantage de surface est souhaitable. [S3]

02 Température & lumière

AIR · JOUR	≈ 21-26 °C [S3]
NUIT · REPÈRE FAMILIAL	≈ 20-21 °C [S5]

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Drosophiles aptères, collemboles et petits grillons ; prévoir une supplémentation adaptée. [S3]

04 L’humidité varie

≥ 75 %

Repère clinique collectif ; éviter le substrat saturé et assurer le drainage. [S3]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Proies consommées · Activité et interactions · État corporel · Humidité et températures · Eau, nettoyage et pontes

Précisions & sources

Dendrobate teint

Comprendre cette fiche

Dendrobate teint : vivarium forestier, humidité, petites proies, reproduction et cohabitation. Fiche sourcée distinguant observations naturelles et soins captifs.

Dendrobates tinctorius est un anoure de la famille des Dendrobatidae. Le nom Dendrobates azureus est placé en synonymie dans le référentiel AMNH consulté ; les variations de couleur ne représentent donc pas automatiquement des espèces distinctes. [S1]

Origine

Forêts de basse altitude du Guyana, du Suriname, de Guyane française et des secteurs brésiliens voisins. [S1] Les observations de terrain utilisées ici proviennent surtout de populations de Guyane française. [S4]

Mode de vie

Diurne ; elle explore le sol forestier, les abris et aussi des surfaces en hauteur. Les interactions territoriales ne se limitent pas aux mâles. [S4][S5]

Taille adulte

4-5 cm de longueur dans la fiche du Muséum national d'Histoire naturelle. La valeur décrit un ordre de grandeur, pas toutes les formes géographiques. [S2]

Longévité

Jusqu'à 15 ans en captivité selon le MNHN ; il s'agit d'une longévité possible, pas d'une moyenne. [S2]

Habitat complet

Chicago Exotics cite environ 61 × 31 × 41 cm comme plus petit terrarium dans une fiche collective incluant D. tinctorius. Ce n'est pas un minimum démontré pour chaque âge ou groupe ; davantage de surface et de refuges est souhaitable. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

3-5 g selon le MNHN, sans répartition par sexe ou forme géographique sur la page. C'est un repère descriptif et non une cible à atteindre. [S2]

Niveau d'expérience : Connaisseur

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : petites proies régulières, eau adaptée, climat humide ventilé et interactions sociales demandent une surveillance fine. [S3][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Air · jour : ≈ 21-26 °C [S3]

Repère clinique collectif ; éviter une zone de chauffe intense.

Nuit : ≈ 20-21 °C : repère familial [S5]

Tree of Life traite plusieurs dendrobatidés ; vérifier l'installation avant toute baisse.

Humidité : Au moins 75 % [S3]

Repère Chicago, avec drainage et ventilation ; pas un sol inondé.

UVB : Faible exposition et zones couvertes [S3][S5]

Bénéfice potentiel discuté ; pas de pourcentage de lampe universel.

Repères de la première page

AIR · JOUR : ≈ 21-26 °C

Notice clinique collective incluant D. tinctorius. [S3]

NUIT · REPÈRE FAMILIAL : ≈ 20-21 °C

Notice Tree of Life sur les dendrobatidés ; pas un optimum propre à chaque population. [S5]

Habitat selon le stade

Une grenouille récemment métamorphosée a des besoins alimentaires et des dimensions différents d'un têtard aquatique. Les sources de captivité retenues ne donnent pas de cotes validées pour chaque stade : ne pas convertir une taille adulte en bac larvaire par une règle de trois.

Pour l'entretien terrestre, prévoir litière, plantes, cachettes et circulation d'air. Un drainage séparé du substrat par une barrière permet d'éviter la saturation ; les détritivores d'un décor bioactif ne remplacent pas le retrait des déchets. [S5]

Eau, substrat et lumière

La peau participe aux échanges avec l'environnement : utiliser une eau sans chlore ni chloramine et un substrat sans additifs nocifs. Éviter toute eau profonde sans sortie ; renouveler l'eau et surveiller l'accumulation sous le drainage. [S3][S5]

Éclairer selon un rythme jour/nuit et ménager des abris. Une LED pour les plantes n'est pas une lampe UVB ; le choix de l'UV et de la supplémentation doit rester cohérent. Les repères familiaux ne prouvent pas un optimum précis pour chaque population. [S5]

Alimentation et fréquence

Drosophiles d'élevage, collemboles et très petits grillons permettent de varier les petites proies. Chicago recommande une distribution quotidienne aux jeunes, puis un jour sur deux aux adultes hors reproduction ; une femelle qui pond peut nécessiter une adaptation. [S3]

Prévoir des élevages de proies fiables et une supplémentation adaptée en calcium et vitamines. Observer ce que chaque individu mange : le nombre versé dans le vivarium ne permet pas à lui seul de suivre l'apport nutritionnel. [S3]

Cohabitation et manipulation

Chicago privilégie les couples pour D. tinctorius plutôt que les groupes. Même un couple doit être observé. Sur le terrain, Rojas et Pašukonis ont décrit poursuites et combats chez les deux sexes : une couleur vive ou une petite taille ne signifie pas absence d'agression. [S3][S4]

Précisions & sources

Dendrobate teint

Éviter les prises en main. Pour un transfert nécessaire, privilégier un récipient propre ; des gants non poudrés humidifiés limitent la contamination de la peau. [S3][S5]

Reproduction et cycle

Les œufs sont déposés hors de l'eau, puis les têtards sont généralement transportés par le mâle vers de petites réserves d'eau. Les larves peuvent être cannibales. Ce cycle décrit en nature ne correspond pas à celui d'une rainette pondant directement en eau libre. [S4]

Ne pas imposer une saison sèche, une baisse thermique ou une densité de têtards sur la seule base de cette synthèse. La reproduction demande un protocole séparé, documenté pour le groupe concerné.

Signes d'alerte et suivi

Perte d'appétit, amaigrissement, déshydratation apparente ou lésions de peau nécessitent une évaluation spécialisée. [S5] Suivre consommation, activité, interactions, photos comparables et mesures du vivarium. Une pesée doit rester utile et limiter les manipulations ; un chiffre isolé ne suffit pas à conclure à une bonne santé.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Stabiliser drainage, ventilation et humidité avant arrivée.

[ ] Prévoir une réserve de petites proies d'élevage.

[ ] Pouvoir séparer les individus en cas de conflit.

Sources consultées

[S1] AMNH - Amphibian Species of the World : Dendrobates tinctorius
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Dendrobatoidea/Dendrobatidae/Dendrobatinae/Dendrobates/Dendrobates-tinctorius
Consulté le 2026-10-20

[S2] MNHN - The poison arrow frog
https://www.mnhn.fr/en/the-poison-arrow-frog
Consulté le 2026-10-20

[S3] Chicago Exotics - Dart Frog Care, Dr Susan Horton
https://www.exoticpetvet.com/dart-frog-care.html
Consulté le 2026-10-20

[S4] Rojas et Pašukonis (2019) - From habitat use to social behavior, PeerJ 7:e7648
https://doi.org/10.7717/peerj.7648
Consulté le 2026-10-20

[S5] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - Poison Dart Frog Care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/amphibians/poison-dart-frog-care
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : H. Zell · CC BY-SA 3.0
Dendrobates tinctorius - Karlsruhe Zoo 05.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Que mange une grenouille en captivité ? Choisir et préparer ses proies

Quarantaine d'une nouvelle grenouille : préparer un accueil séparé

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/dendrobate-teint/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.