
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Dendrobate doré

Dendrobates auratus



Du sud du Nicaragua au nord-ouest de la Colombie, avec une répartition différente sur les versants caraïbe et pacifique ; une population a été introduite sur Oahu. [S1] Diurne, utilisant le sol et des supports pour grimper. [S3]

Origine à préciser | Petites proies

TAILLE

2,5-4 cm

Longueur corporelle, zoo de Sapporo [S2].

LONGÉVITÉ

≈ 10 ans

Repère captif du zoo, non garantie [S2].

MODE DE VIE

Sol et supports

Activité diurne [S3].

01 Terrarium de référence

À partir de 50 × 50 × 50 cm

Conseil DendroBase, à adapter aux occupants [S4].

02 Température & lumière

BASSE ALTITUDE	**24-26 °C [S4]**
ALTITUDE	**20-24 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Drosophiles et collemboles adaptés ; suivre les captures réelles [S3].

04 L’humidité varie

Cycle et sol à observer

Pas de consigne uniforme pour toutes les localités [S3][S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Provenance · Repas · Comportement · Développement

Précisions & sources

Dendrobate doré

Comprendre cette fiche

Dendrobate doré : comparer les milieux des localités, aménager le terrarium, nourrir et comprendre les soins paternels, avec conseils et limites sourcés.

Dendrobates auratus est une petite grenouille américaine aux dessins variables. Le nom accepté figure dans Amphibian Species of the World, qui distingue son aire naturelle de son introduction à Hawaï. [S1] Sa fiche doit décrire une origine documentée plutôt que déduire un climat de la seule couleur.

Origine

Du sud du Nicaragua au nord-ouest de la Colombie, avec une répartition différente sur les versants caraïbe et pacifique ; une population a été introduite sur Oahu. [S1]

Habitat complet

DendroBase propose un terrarium à partir de 50 × 50 × 50 cm ; la répartition des refuges et la compatibilité des occupants restent à contrôler. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Température : 24-26 °C pour les formes de basse altitude selon DendroBase [S4]

Le même guide propose 20-24 °C pour des formes d’altitude : provenance à documenter.

Humidité : Variable selon le milieu et le cycle [S3]

Le tableau de FantasticFrogs varie au fil des mois ; aucune valeur constante universelle n’est retenue.

Sol : Drainage, litière et retraits [S3]

Le substrat doit rester inspectable sous les plantes et les refuges.

Repères de la première page

BASSE ALTITUDE : 24-26 °C

Guide DendroBase ; provenance à vérifier [S4].

ALTITUDE : 20-24 °C

Autre contexte dans le même guide [S4].

Une espèce, plusieurs provenances

Le référentiel de l’AMNH présente une répartition naturelle centrée sur l’Amérique centrale et le nord-ouest colombien. [S1] Une origine « Hawaï » ne signifie donc pas que l’espèce y soit endémique. À l’achat, distinguer le nom du vendeur, le nom de la lignée et une localité attestée. Une photographie verte et noire ne permet pas, à elle seule, de choisir un régime saisonnier précis ni de certifier une provenance.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 2,5-4 cm dans la présentation du zoo de Sapporo : longueur corporelle de la grenouille, sans les pattes étendues. Ce repère ne décrit pas toutes les lignées séparément. [S2]

Le zoo de Sapporo annonce environ 10 ans en captivité, sans préciser une cohorte ou un record individuel. C’est un ordre de grandeur attribué, non une durée garantie. [S2]

Diurne, utilisant le sol et des supports pour grimper. [S3]

Relier la litière aux supports

FantasticFrogs décrit des adultes associés à des arbres et utilisant aussi la hauteur ; son aménagement comprend branches, petites pièces de bois et végétation. [S3] Le projet doit conserver des itinéraires accessibles entre ces éléments et le sol. Une paroi très décorée n’ajoute pas automatiquement une surface utilisable. Laisser quelques zones visibles permet d’observer les prises alimentaires sans retirer les refuges à chaque contrôle.

Le climat dépend aussi du point mesuré

DendroBase distingue les formes de basse altitude et celles d’altitude dans ses conseils thermiques. [S4] Cette distinction ne doit pas devenir un changement automatique de thermostat lorsque le vendeur emploie un nom commercial. Tant que l’origine reste incertaine, faire relire le projet avec ses mesures réelles. Relever la température au niveau des animaux, à l’ombre et près des éclairages, permet d’identifier un écart caché par la température moyenne de la pièce.

Une humidité entretenue sans inonder

Le guide FantasticFrogs associe drainage, litière et petit point d’eau accessible. [S3] Ces éléments remplissent des fonctions différentes : le drainage évacue un surplus, les feuilles structurent les retraits et le point d’eau reste directement inspectable. Prévoir comment vider la réserve inférieure avant de planter évite de dépendre d’un démontage complet. L’humidité affichée par une sonde ne renseigne pas, à elle seule, sur l’état du substrat sous une écorce.

Préparer les élevages de petites proies

Drosophiles et collemboles font partie des aliments décrits dans le guide de maintien. [S3] La disponibilité régulière de proies adaptées doit précéder l’arrivée des grenouilles. Plusieurs cultures décalées réduisent la dépendance à une seule boîte. Lors de la distribution, distinguer les insectes introduits de ceux réellement capturés ; les restes dans un recoin ne prouvent pas qu’un individu timide a mangé. Une supplémentation doit suivre un programme cohérent plutôt qu’un cumul de produits.

Groupe visible, relations parfois discrètes

DendroBase recommande une attention aux comportements de domination et une séparation si nécessaire. [S4] Le fait que deux animaux soient présents dans le même refuge ne suffit pas à valider le groupe. Observer l’accès aux proies, la répartition des retraits et les déplacements au fil de plusieurs jours. Un contenant de séparation déjà équipé est plus utile qu’une solution improvisée après la découverte d’un animal constamment tenu à l’écart.

Précisions & sources

Dendrobate doré

Des soins paternels documentés

Le zoo de Sapporo décrit des œufs déposés sous des feuilles, entretenus par le mâle jusqu'à l'éclosion, puis un transport individuel des larves sur son dos jusqu'à l'eau. [S2] La présence d'un mâle portant une larve ne signifie pas que toute une ponte a réussi. Pour un projet reproductif, identifier séparément les dépôts, les éclosions et les jeunes ayant terminé leur métamorphose permet de comprendre les étapes réellement observées.

Anticiper la métamorphose

FantasticFrogs prévoit des installations adaptées aux têtards puis un accès progressif à la terre lors de la transformation. [S3] Les petits récipients ne doivent pas être préparés au dernier moment, sans plan pour l'eau ni les proies des jeunes. Conserver la filiation et éviter de mélanger les origines permet aussi de transmettre une information fiable lors d'une cession. Choisir une origine captive documentée, vérifier les obligations applicables et ne pratiquer aucun prélèvement ni relâcher dans la nature.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Préparer plusieurs cultures de proies.

[ ] Mesurer près du sol et des supports.

[ ] Prévoir une séparation fonctionnelle.

Sources consultées

[S1] Amphibian Species of the World - Dendrobates auratus
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Dendrobatoidea/Dendrobatidae/Dendrobatinae/Dendrobates/Dendrobates-auratus
Consulté le 2026-10-26

[S2] Zoo de Sapporo, Maruyama - Dendrobates auratus
https://www.city.sapporo.jp/zoo/089-j.html
Consulté le 2026-10-26

[S3] FantasticFrogs - Dendrobates auratus management overview
https://fantasticfrogs.co.uk/wp-content/uploads/2023/03/Dendrobates-auratus-care-sheet.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] Ostrowski et Mahn, DendroBase - Dendrobates auratus
https://www.dendrobase.de/html/D_dendrobates_auratus.html
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : snail_hiker · CC BY 4.0
Dendrobates auratus - Goldbaumsteiger 203695198.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Quarantaine des amphibiens : préparer un accueil séparé

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Que mange une grenouille en captivité ? Aliments et repas

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/dendrobates-auratus/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.