
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Dendrobate à bandes jaunes

Dendrobates leucomelas



Bassin guyanais de l'Orénoque au Venezuela, Guyana, extrême nord du Brésil et est de l'Amazonie colombienne, selon Amphibian Species of the World. [S1] Diurne, utilisant surtout le sol et les surfaces basses, avec capacité de grimper ; comportements territoriaux possibles. [S2]

Litière et refuges | Petites proies

TAILLE

3,1-5 cm

Museau-cloaque [S2].

LONGÉVITÉ

10-15 ans proposés

Repère zoologique captif [S3].

MODE DE VIE

Diurne, sol et reliefs

Peut grimper [S2].

01 Couple, repère éleveur

≈46 ×46 ×30 cm

Froglandia ; surface aménagée à privilégier [S4].

02 Température & lumière

AIR DE JOUR	**≈20-26 °C [S4]**
RELIEFS	**Accessibles et bas [S2] [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Drosophiles, collemboles et grillons adaptés ; suivre chaque individu [S3].

04 L'humidité varie

70-80 % proposés

Pratique Froglandia, avec aération et drainage [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Humidité · Interactions · Ponte

Précisions & sources

Dendrobate à bandes jaunes

Comprendre cette fiche

Dendrobate à bandes jaunes : terrarium planté, humidité, petites proies, territorialité et reproduction. Repères d’élevage distingués de l’histoire naturelle.

Dendrobates leucomelas est une grenouille diurne du nord de l’Amérique du Sud, reconnaissable à ses bandes et taches jaunes et noires. [S1][S2] Elle utilise le sol forestier mais peut aussi grimper. Un terrarium planté doit donc associer litière, retraits et petits reliefs utilisables.

Origine

Bassin guyanais de l’Orénoque au Venezuela, Guyana, extrême nord du Brésil et est de l’Amazonie colombienne, selon Amphibian Species of the World. [S1]

Habitat complet

Froglandia propose environ 46 ×46 ×30 cm pour un couple. C’est un repère d’éleveur attribué, pas une norme de bien-être expérimentale ; davantage de surface aménagée reste utile. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Air de jour : Environ 20-26 °C dans le guide Froglandia [S4]

Conversion de 68-78°F ; ne pas confondre climat régional et température imposée.

Humidité relative : 70-80 % privilégiés par ce guide [S4]

Avec litière humide par endroits et renouvellement d’air ; pas de sol noyé.

Organisation : Sol, refuges et reliefs bas [S2][S4]

Conserver des points de repas visibles.

Repères de la première page

AIR DE JOUR : ≈20-26 °C

Froglandia [S4].

RELIEFS : Accessibles et bas

Sol continu et refuges [S2][S4].

Nom d’espèce et lignée

Le référentiel conserve Dendrobates leucomelas, avec une distribution géographique définie. [S1] Les noms de lignées utilisés en élevage ne doivent pas être transformés automatiquement en sous-espèces. Une couleur plus orange ou une bande interrompue ne suffit pas à prouver une localité. Pour un projet reproductif, conserver le nom annoncé et les documents de filiation évite de perdre une information qui ne pourra pas être reconstruite à partir des photographies.

Taille adulte, longévité et mode de vie

ADW donne 3,1-5 cm de longueur museau-cloaque, avec beaucoup d’adultes autour de 4 cm ; les femelles sont généralement plus grandes. [S2]

Le zoo de Zagreb présente 10-15 ans en captivité comme repère éducatif. Le record de 20,5 ans parfois cité pour Dendrobates n’est pas attribué ici avec certitude à cette espèce. [S2][S3]

Diurne, utilisant surtout le sol et les surfaces basses, avec capacité de grimper ; comportements territoriaux possibles. [S2]

Un sol de forêt avec des voies de passage

ADW décrit une grenouille active au sol et capable d’escalader la végétation. [S2] Le décor peut traduire cela par plusieurs niveaux accessibles, tout en conservant une surface basse continue. Une cascade ou un bassin important n’est pas nécessaire pour rendre l’installation intéressante. Les passages derrière les racines doivent rester inspectables et suffisamment dégagés pour que l’animal ne soit pas condamné à contourner une seule zone occupée.

Humidité et ventilation se contrôlent ensemble

Froglandia recommande un drainage, de la litière et un échange d’air qui évite la stagnation. [S4] Pour comprendre le fonctionnement du bac, observer ce qui sèche entre les pulvérisations et ce qui reste humide sous les feuilles. Un hygromètre placé dans le jet ne décrit pas tout le terrarium. La quantité d’eau introduite doit être liée à ce que le drainage peut réellement recevoir et à la facilité de retirer son excédent.

Prévoir les petites proies avant les grenouilles

Le zoo de Zagreb utilise notamment collemboles, drosophiles et grillons. [S3] Leur disponibilité doit être organisée en continu : une culture qui fonctionne aujourd’hui ne garantit pas la suivante. Prévoir plusieurs lots décalés réduit la dépendance à un seul contenant. Le nourrissage doit rester observable pour vérifier que chaque individu mange ; la présence de microfaune dans un terrarium ne suffit pas à prouver une ration complète.

Chants et territorialité

Les mâles produisent des appels et peuvent défendre un espace reproductif. [S2] La visibilité et le chant sont intéressants à suivre, mais ne constituent pas seuls une preuve de bonne santé ou de compatibilité. Un individu qui reste caché pendant les repas peut être discret ou gêné par un congénère : il faut regarder l’accès effectif aux ressources. La possibilité de séparation est à prévoir avant de maintenir un groupe.

Précisions & sources

Dendrobate à bandes jaunes

Une ponte terrestre suivie de têtards

Le zoo décrit de petits groupes d’œufs et des soins du mâle. [S3] ADW rapporte le transport des têtards vers l’eau, tout en signalant des contradictions dans certaines anciennes synthèses. [S2] Le suivi doit distinguer la ponte terrestre de la phase aquatique ultérieure. Les aménagements et la nourriture des têtards se préparent séparément ; le terrarium des parents n’est pas, à lui seul, un dispositif complet d’élevage.

Des étapes plutôt qu’un rendement

Une date de ponte, une première éclosion et une sortie de l’eau sont des événements différents. Les durées publiées dépendent des conditions et des lots ; elles ne permettent pas de promettre un nombre de jeunes à une échéance fixe. Photographier les stades sans déplacer systématiquement les œufs donne des repères utiles. La disponibilité de proies minuscules et d’un logement sûr devient particulièrement importante au moment où les jeunes commencent leur vie terrestre.

Acquisition et observation responsable

Demander une provenance captive documentée, conserver la lignée annoncée et vérifier les règles actuelles avant toute acquisition ou cession. Les couleurs ne sont pas une invitation à manipuler. L’observation à travers les vitres permet déjà de suivre déplacements, repas et interactions. Une baisse durable d’état ou une lésion doit conduire à un avis professionnel ; cette fiche ne fournit ni protocole de traitement ni dosage automatique de compléments.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer plusieurs cultures de proies.

[ ] Vérifier drainage et ventilation.

[ ] Prévoir séparation des individus.

Sources consultées

[S1] Amphibian Species of the World - Dendrobates leucomelas
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Dendrobatoidea/Dendrobatidae/Dendrobatinae/Dendrobates/Dendrobates-leucomelas
Consulté le 2026-10-26

[S2] University of Michigan, Animal Diversity Web - Dendrobates leucomelas
https://animaldiversity.org/accounts/Dendrobates_leucomelas/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Zoo Zagreb - Dendrobates leucomelas
https://zoo.hr/zutopruga-otrovna-zaba-dendrobates-leucomelas/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Froglandia - Dendrobates leucomelas care sheet
https://www.froglandia.com/wp-content/uploads/2019/11/Dendrobates-Leucomelas.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Whaldener Endo · CC0
Dendrobates leucomelas 332126273.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Quarantaine des amphibiens : préparer un accueil séparé

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Que mange une grenouille en captivité ? Aliments et repas

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/dendrobates-leucomelas/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.