COMPRENDRE SON ESPÈCE

Émydure à ventre rouge

Emydura subglobosa



Nouvelle-Guinée méridionale et Australie septentrionale ; The Reptile Database distingue actuellement les sous-espèces subglobosa et worrelli et signale des limites encore discutées. [S1] Aquatique, nage et recherche alimentaire dans l'eau, avec exposition émergée. [S2]

Pleurodire | Aquatique

TAILLE

Jusqu'à ≈25,5 cm

Carapace, femelle [S2].

LONGÉVITÉ

Non chiffrée

Pas de record spécifique retenu.

MODE DE VIE

Grande nageuse

Eau et exposition sèche [S2].

01 Surface proposée

150 × 60 cm

Objectif spécialisé pour un grand adulte [S3].

02 Température & lumière

EAU	**24-28 °C [S3] [S4]**
PLAGE	**32-35 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Aliment formulé et diversité de ressources animales, avec bilan individuel [S4].

04 L'humidité varie

Zone sèche accessible

Eau filtrée et plateforme entièrement émergée [S3][S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carapace · Nage · Repas · Eau

Précisions & sources

Émydure à ventre rouge

Comprendre cette fiche

Émydure à ventre rouge : taille par sexe, nage, filtration, plage sèche, alimentation et reproduction. Sources spécialisées comparées et limites explicites.

Emydura subglobosa appartient aux tortues pleurodires : elle replie son cou latéralement. [S1][S2] Son ventre coloré attire l'attention, mais son principal besoin spatial est celui d'une nageuse adulte. Les renseignements de cette fiche concernent l'espèce identifiée, sans assimiler toutes les tortues australiennes à cou court à un seul protocole.

Origine

Nouvelle-Guinée méridionale et Australie septentrionale ; The Reptile Database distingue actuellement les sous-espèces subglobosa et worrelli et signale des limites encore discutées. [S1]

Habitat complet

Herpeton propose une surface de 150 × 60 cm comme objectif pour un adulte de grande taille ; Austin recommande au moins 75 gallons américains, environ 284 litres. Ce sont des conseils spécialisés, pas une norme commune. [S3][S4]

Paramètres et méthode de mesure

Eau : 24-28 °C selon Herpeton [S3]

Austin donne des repères plus frais : garder visible l'origine de la consigne, puis l'adapter avec un professionnel [S4].

Plage sèche : 32-35 °C selon Herpeton [S3]

Mesure de surface distincte de celle de l'eau.

Repères de la première page

EAU : 24-28 °C

Herpeton ; sources divergentes [S3][S4].

PLAGE : 32-35 °C

Herpeton [S3].

Provenance et variations

Le référentiel actuel maintient worrelli comme sous-espèce et traite angkibaanya comme synonyme de la forme nominale. [S1] Les anciennes étiquettes doivent rester dans l'historique plutôt qu'être effacées sans explication. Une localité commerciale ou une teinte rose ne suffit pas à déterminer la sous-espèce. Une identification douteuse doit être signalée avant de comparer des données de croissance ou d'envisager des reproductions.

Taille adulte, longévité et mode de vie

ADW donne 13,3-17,3 cm de carapace chez les mâles et 15,2-25,5 cm chez les femelles ; ce sont des plages descriptives, pas des tailles garanties. [S2]

Une longévité spécifique solidement documentée n'est pas retenue ici : les extrapolations familiales d'ADW ne sont pas présentées comme un record de cette espèce.

Aquatique, nage et recherche alimentaire dans l'eau, avec exposition émergée. [S2]

Déplacements et architecture du bac

ADW décrit des rivières, marais et zones inondées, avec une grande partie de la vie passée dans l'eau. [S2] Prévoir une longueur de nage utile compte autant que le volume affiché. Examiner le bac à la taille de la carapace adulte : virages, passages latéraux et trajet vers la surface doivent rester dégagés. Le cou replié sur le côté rend particulièrement peu souhaitables les fentes étroites entre décor et paroi.

Filtration et accès de maintenance

Herpeton recommande une filtration biologique installée et le contrôle de l'ammoniac et des nitrites. [S3]
L'implantation du filtre doit permettre de retirer les déchets sans retourner toutes les cachettes à chaque intervention. Pour juger une amélioration, comparer les résultats avant et après le nettoyage, avec le même test. Une eau visuellement limpide et une pompe bruyante ne sont pas deux preuves de bon fonctionnement biologique.

Une vraie sortie sèche

Austin insiste sur une plateforme chauffée et des UVB pour cette tortue qui s'expose. [S4] Vérifier que le corps entier tient hors de l'eau, sans enfoncement du support. Un animal peut atteindre la rampe mais ne jamais réussir à se sécher complètement. Une observation à distance permet de voir cette différence, puis d'ajuster la forme du support au lieu d'augmenter automatiquement la puissance de chauffe.

Alimentation aquatique

Austin cite poissons, invertébrés et aliments formulés dans son expérience captive. [S4] La variété des catégories ne rend pas toutes les combinaisons nutritionnellement équivalentes. Définir avec un professionnel une base de ration identifiable, puis conserver les quantités réellement consommées. Les déchets alimentaires doivent être retirables : une cavité décorative qui accumule les restes complique à la fois le contrôle du repas et celui de l'eau.

Reproduction sans généralisation

L'oviparité est confirmée par le référentiel. [S1] ADW décrit la sortie terrestre des femelles pour déposer les œufs, mais plusieurs autres paragraphes de sa fiche concernent plus largement les Emydura ou les Chelidae. [S2] Les âges de maturité et les très grandes longévités de ces groupes ne sont donc pas appliqués automatiquement ici. Un projet reproductif demande notamment un site de ponte adapté et une vérification de l'identité des parents.

Précisions & sources

Émydure à ventre rouge

Couleurs et observations comparables

Austin et ADW signalent que les couleurs très vives des jeunes s’atténuent avec l’âge. [S4][S2] Photographier sous un éclairage constant aide à ne pas confondre changement d’éclairage, changement naturel et anomalie récente. Cette comparaison complète l’observation de l’appétit, de la nage et de la carapace ; elle ne remplace pas un examen vétérinaire lorsqu’un changement inhabituel persiste.

Cohabitation et responsabilité

Les recommandations spécialisées divergent sur la cohabitation : Austin est favorable aux communautés de certaines tortues, alors qu’Herpeton rappelle les agressions possibles. [S4][S3] Cette fiche ne transforme pas la première opinion en garantie d’entente. Prévoir une séparation réelle avant toute association, conserver la provenance captive et ne pas prélever ni relâcher. Vérifier les obligations locales avant acquisition, sans déduire une autorisation du seul nom de l’espèce.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver l’étiquette de provenance.

[ ] Prévoir des virages adultes.

[ ] Tester la plateforme à pleine charge.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Emydura subglobosa
https://reptile-database.reptarium.cz/Emydura/subglobosa
Consulté le 2026-10-26

[S2] Animal Diversity Web - Emydura subglobosa
https://animaldiversity.org/accounts/Emydura_subglobosa/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Herpeton Academy - Emydura subglobosa
https://academy.herpeton.net/en/caresheets/turtles/emydura-subglobosa/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Austin’s Turtle Page - Red-Bellied Shortneck
https://www.austinsturtlepage.com/Care/cs-redside.htm
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Sweetsandz · CC BY-SA 3.0
Emydura subglobosa.jpeg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aquaterrarium pour tortue aquatique : préparer un habitat fonctionnel

Alimentation d’une tortue aquatique : identifier les besoins avant le menu

Lampe pour terrarium : éclairage UVB, LED, chauffage et distances

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/emydura-subglobosa/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.