
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Eurydactylodes agricolae

Eurydactylodes agricolae



Petit gecko arboricole de Nouvelle-Calédonie ; Endemia rapporte une activité diurne que les guides captifs ne décrivent pas toujours de la même façon [S2][S3][S4].

Arboricole | Petite taille

TAILLE ADULTE

≤ 5,5 cm

Museau-cloaque ; queue exclue, selon Endemia [S2].

ACTIVITÉ

Arboricole

Activité diurne rapportée sur le terrain [S2].

RÉGIME

Omnivore

Petites proies et préparation fruitée adaptée [S3][S4].

01 Aménager son habitat

≈ 30 × 30 × 46 cm

Repère d'éleveurs pour les espèces explicitement traitées ; branches fines [S3][S4].

02 Température & lumière

AMBIANCE DIURNE **21-24 °C [S3] [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Petites proies et préparation adaptée ; servir de faibles quantités permettant de suivre les prises [S3][S4].

04 L'humidité varie

Alternance humide-sec

Pulvérisation puis séchage des surfaces ; pas de pourcentage validé [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Eurydactylodes agricolae

Comprendre cette fiche

Eurydactylodes agricolae : reconnaître ce petit gecko calédonien, organiser ses branches fines et comprendre les limites des conseils de maintien.

Petit gecko arboricole de Nouvelle-Calédonie, Eurydactylodes agricolae reste souvent installé parmi les rameaux. Sa discrétion repose sur le camouflage et non sur une vie exclusivement cachée [S2].

Origine

Nord-ouest de la Grande Terre et îles proches, dont Yandé et Bélep ; les populations occupent plusieurs formations végétales, du maquis aux forêts [S1][S2].

Habitat complet

Pangea et 402 Exotics proposent environ 30 × 30 × 46 cm, avec branches fines ; repère d'éleveurs traitant explicitement E. agricolae et E. vieillardi [S3][S4].

Paramètres et méthode de mesure

Ambiance diurne : 21-24 °C [S3][S4]

Conversion arrondie des 70-75 °F proposés par les éleveurs.

Humidité : Alternance humide-sec [S4]

Gouttelettes accessibles, puis séchage des surfaces exposées ; pas de pourcentage validé.

Repères de la première page

AMBIANCE DIURNE : 21-24 °C

Repère des deux sources d'élevage [S3][S4].

Identifier sans confondre les espèces

La bande claire entre la bouche et l'oreille aide à distinguer agricolae de vieillardi ; les noms commerciaux seuls restent insuffisants [S2][S3]. La base taxonomique reconnaît agricolae comme espèce distincte, décrite en 2001 [S1]. Conserver une photographie de profil avec la désignation du cédant est particulièrement utile : une correction ultérieure d'identité doit pouvoir être rattachée au même individu, sans effacer son histoire ni attribuer automatiquement ses descendants à une autre lignée.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Jusqu'à 55 mm du museau au cloaque selon Endemia ; cette mesure exclut entièrement la queue [S2].

Aucune durée moyenne ni longévité maximale spécifiquement documentée n'a été établie dans les sources retenues.

Arboricole ; activité diurne rapportée sur le terrain, alors que les guides captifs insistent davantage sur la nuit [S2][S3].

Faire du petit volume un espace réellement utilisable

Les supports fins sont centraux dans l'aménagement décrit par Matt Parks : ils permettent une prise complète avec les doigts et la queue [S3]. Dessiner plusieurs trajets continus avant de fixer le décor évite les grandes portions de vide. Le diamètre des rameaux compte autant que leur nombre. Prévoir un accès à chaque récipient depuis une branche et laisser la possibilité de nettoyer sans arracher les plantes constitue un choix pratique de conception, pas une mesure tirée du milieu naturel.

Climat : comprendre les divergences

Pangea propose aussi une chauffe localisée à 27-29 °C, tandis que 402 Exotics insiste sur l'évitement d'une chaleur durable au-dessus d'environ 27 °C [S3][S4]. Ces expériences ne justifient pas de chauffer uniformément le terrarium. La décision dépend donc du gradient réellement obtenu, de la pièce et de l'emplacement des refuges. Mesurer le rameau le plus exposé après plusieurs heures d'éclairage permet de détecter une accumulation que la température matinale de la pièce ne montre pas.

Hydratation et lumière

L'éleveur 402 Exotics utilise des pulvérisations permettant de boire et garde une coupelle peu profonde ; il recommande un cycle lumineux avec zones ombragées [S4]. La faible taille du gecko impose de regarder les accès, et non seulement la présence de ces équipements. Une feuille peut retenir des gouttes alors que le support voisin sèche déjà. Ce contraste peut être observé directement. Aucun indice UV chiffré propre à cette espèce n'est suffisamment documenté ici pour annoncer une valeur cible.

Aliments et contrôle des prises

Les deux élevages consultés associent une préparation complète pour geckos omnivores à de très petites proies ; Pangea cite notamment drosophiles et jeunes grillons [S3][S4]. Une portion minime rend les traces de consommation plus lisibles. Pour comparer deux présentations, conserver le même emplacement et noter la texture préparée. Les compléments doivent être examinés avec la composition de l'aliment complet et l'éclairage : additionner des poudres différentes sans connaître leur apport n'améliore pas automatiquement le menu.

Précisions & sources

Eurydactylodes agricolae

Observer un camouflage vivant

Endemia décrit des animaux restant sur les rameaux et dans le feuillage pendant le repos, avec une activité au moins partiellement diurne [S2]. Ne pas voir de déplacement à une heure précise n'autorise donc pas à conclure à une apathie. Observer plusieurs moments sans toucher la branche donne une information plus pertinente. Les ouvrants et passages de câbles méritent une vérification attentive : la finesse de l'animal rend trompeuse l'impression qu'un terrarium destiné à un gecko plus grand est suffisamment fermé [S4].

Reproduction : ce qui est établi

L'espèce est ovipare [S1]. Les sources retenues ne permettent pas de proposer un calendrier chiffré de ponte et d'incubation propre à une population documentée. Cette fiche ne transforme donc pas les durées publiées pour le genre en promesse de résultat. Un projet de reproduction doit prévoir des installations séparées pour suivre les jeunes, l'identification des parents et la possibilité de retirer un partenaire. La simple coexistence observée dans une photographie ne démontre pas une compatibilité durable.

Suivre une espèce aux données dispersées

Les mesures de masse doivent être interprétées avec la précision réelle de la balance, essentielle pour un animal aussi petit. Une photographie prise dans les mêmes conditions aide à documenter la silhouette sans imposer des manipulations répétées. Endemia signale les conséquences possibles des feux, des activités minières et des espèces introduites sur les habitats [S2]. La traçabilité d'une lignée captive apporte une information différente : elle documente l'animal détenu, mais ne remplace ni une étude de population ni une action de conservation.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier l'identité et conserver la provenance de l'animal.

[ ] Installer et mesurer les refuges avant son arrivée.

[ ] Prévoir un suivi individuel des repas, mues et déplacements.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Eurydactylodes agricolae
https://reptile-database.reptarium.cz/Eurydactylodes/agricolae
Consulté le 2026-10-26

[S2] Endemia - Eurydactylodes agricolae
https://endemia.nc/faune/fiche4931
Consulté le 2026-10-26

[S3] Matt Parks, Pangea - Eurydactylodes Care & Information
https://www.pangeareptile.com/blogs/care-breeding/eurydactylodes-care-information
Consulté le 2026-10-26

[S4] 402 Exotics - Eurydactylodes care guide
https://402exotics.com/eurydactylodes/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Jokuyken15 · CC BY 4.0
Eurydactylodes agricolae.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Peut-on faire cohabiter des reptiles dans le même terrarium ?

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/eurydactylodes-agricolae/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.