


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Gecko à queue grasse

Hemitheconyx caudicinctus

Afrique de l'Ouest, du Sénégal au nord du Cameroun. Nocturne et terrestre, il se réfugie au sol pendant la journée. [S2]

Terrestre · Nocturne

TAILLE ADULTE	LONGÉVITÉ	MODE DE VIE
18-23 cm	10-20 ans	Au sol
Longueur totale [S1].	En captivité [S2].	Surtout nocturne [S2].

01 Des refuges au sol

91 × 46 × 46 cm

Minimum Linville ; longueur × profondeur × hauteur [S3].

02 Température & lumière

SOL CHAUD · JOUR	**31-33 °C [S1]**
CÔTÉ FRAIS · JOUR	**24-27 °C [S1]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Insectes variés et nourris avant distribution ; suivre la consommation [S1].

04 L'humidité varie

50-70 %

Avec refuge humide et zone plus sèche [S1].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas et proies restantes · Poids · Mues et doigts · Selles · Humidité et température du sol

Précisions & sources

Gecko à queue grasse

Comprendre cette fiche

Un gecko ouest-africain discret, terrestre et nocturne, qui demande un gradient thermique et un refuge humide disponible.

Hemitheconyx caudicinctus est distinct du gecko léopard. Ses paramètres sont issus de guides qui le nomment explicitement ; ils ne sont pas repris automatiquement d'Eublepharis macularius. [S1][S3]

Origine

Afrique de l'Ouest : ADW situe son aire du Sénégal au nord du Cameroun, dans des savanes et boisements rocheux où il se réfugie pendant la journée. [S2]

Mode de vie

Nocturne et terrestre ; il utilise les abris au sol. Ses paupières mobiles et l'absence de pelotes adhésives le distinguent de nombreux geckos arboricoles. [S2]

Taille adulte

18-23 cm de longueur totale, conversion des 7-9 pouces publiés. [S1]

Longévité

10-20 ans en captivité dans les guides Tree of Life et ADW. [S1][S2]

Habitat complet

Robert L. Linville, DVM, propose au minimum 91 × 46 × 46 cm pour un adulte, longueur × profondeur × hauteur, conversion arrondie de 36 × 18 × 18 pouces. [S3]

Poids adulte : lire le contexte

Pas de plage adulte consolidée : le texte et le tableau d'ADW divergent. Aucun poids cible n'en est déduit. [S2]

Niveau d'expérience : Débutant accompagné

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Appréciation éditoriale : un projet accessible avec accompagnement et préparation des proies. Sa discrétion impose de vérifier individuellement la consommation et l'utilisation des refuges. [S1]

Paramètres et méthode de mesure

Jour : Sol chaud 31-33 °C ; côté frais 24-27 °C [S1]

Mesure du substrat.

Nuit : 21-24 °C [S1]

Mesure nocturne.

Éclairage : 10-12 h par jour ; UVB faibles [S1]

UVI non précisé ; exposition à calibrer.

Humidité : 50-70 % et refuge humide [S1]

Zone plus sèche et eau disponible.

Repères de la première page

SOL CHAUD · JOUR : 31-33 °C

Température du substrat [S1].

CÔTÉ FRAIS · JOUR : 24-27 °C

Repère vétérinaire [S1].

Aménager un sol protecteur

Linville décrit refuges chaud, frais et humide, liège et feuilles au sol. Ces éléments permettent de circuler à couvert. [S3] Vérifier dans le plan d'installation que sondes et coupelle ne bloquent pas les entrées.

Tree of Life décrit un mélange adapté de terre, sable et fibre de coco ; le papier convient aux jeunes ou à l'observation sanitaire. Écarter le sable calcique et les sols constamment détrempés. [S1]

Nourrir chaque stade

Insectes quotidiens aux jeunes, trois à quatre fois par semaine aux adultes ; nourrir les proies 24-48 heures auparavant. Coordonner compléments et UVB avec le vétérinaire. [S1]

Noter ce qui reste après chaque distribution permet de distinguer un repas refusé d'une portion excessive. Conserver dans le carnet le type et la taille des proies, et les changements de produit ; cette organisation aide à expliquer les évolutions d'appétit sans imposer un nombre universel d'insectes.

Respecter son rythme

ADW décrit une espèce qui se cache durant le jour et chasse la nuit. Sa queue sert de réserve et peut être abandonnée en défense ; ne jamais la saisir. Les mâles défendent leur territoire. L'hébergement individuel facilite un suivi sans compétition. [S2][S3]

Reproduction : connaissances et limites

L'espèce est ovipare. ADW rapporte de petites pontes et un développement des œufs dépendant des conditions ; les jeunes deviennent autonomes et les adultes peuvent représenter une menace pour eux. Ces informations biologiques ne définissent pas une température d'incubation à appliquer chez soi. [S2]

Aucun âge ou poids seuil de reproduction n'est validé dans cette fiche. Préparer les espaces séparés et un suivi de la femelle avant tout projet ; ne pas provoquer un cycle par refroidissement sur la base de ce résumé.

Suivi et signaux d'alerte

Refus alimentaire associé à une perte de poids, faiblesse ou mue retenue justifient une consultation. [S1] Le guide de Linville recommande de conserver poids, appétit, selles, mues et événements reproductifs dans un suivi individuel. [S3]

Précisions & sources

Gecko à queue grasse

Chaque jour, vérifier l’eau, les sondes, l’état des refuges et l’apparence de l’animal sans le déloger inutilement. Photographier une anomalie et dater son apparition facilite la comparaison ; le carnet décrit des observations et ne remplace pas l’examen vétérinaire.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer abris chaud, frais et humide. [S3]

[ ] Vérifier la chaleur au niveau du sol. [S1]

[ ] Prévoir un suivi individuel des repas et mues. [S3]

Sources consultées

[S1] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - African Fat-Tailed Gecko Care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/lizards/african-fat-tailed-gecko-care
Consulté le 2026-10-20

[S2] University of Michigan, Animal Diversity Web - Hemitheconyx caudicinctus
https://animaldiversity.org/accounts/Hemitheconyx_caudicinctus/
Consulté le 2026-10-20

[S3] Robert L. Linville, DVM - Gecko Care
https://www.petdoc.ws/GeckoCare.htm
Consulté le 2026-10-20

Photographie et licence

Photo : Stolbovsky · CC BY-SA 3.0
Hemitheconyx caudicinctus in Yaroslavl Zoo.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/gecko-queue-grasse/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.