

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Graptémyde pseudogéographique

Graptemys pseudogeographica

Principalement bassin du Mississippi et régions associées aux États-Unis ; le référentiel distingue les formes pseudogeographica et kohnii. [S1]
Diurne, aquatique, utilisant rivières et eaux annexes avec des supports d’exposition. [S2][S4]

Dimorphisme marqué | Plage sèche

TAILLE
9-27,8 cm
Carapace, fort effet du sexe [S2][S3].

LONGÉVITÉ
Non chiffrée
Sources retenues insuffisantes.

MODE DE VIE
Aquatique diurne
Rivières et bras calmes [S2].

01 Installation proposée

≥120 ×60 ×60 cm

À agrandir selon l’individu ; guide spécialisé [S4].

02 Température & lumière

EAU	**22-26 °C [S4]**
PLAGE	**30-34 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Ressources animales et végétales ; ration captive adaptée à l’individu [S2][S3].

04 L’humidité varie

Plage vraiment sèche

La qualité de l’eau est prioritaire [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER
Carapace · Sexe · Eau · Exposition

Précisions & sources

Graptémyde pseudogéographique

Comprendre cette fiche

Graptémyde pseudogéographique : différence mâle-femelle, nage, eau, UVB, alimentation et ponte. Une fiche qui contextualise les observations du Nebraska.

Graptemys pseudogeographica est une tortue nord-américaine de cours d'eau. La différence de taille entre les sexes peut transformer complètement le projet d'aquarium. [S2][S3] Une petite carapace juvénile ne renseigne pas l'encombrement de la future femelle ; la surface de nage et la solidité de la plage doivent être prévues dès le départ.

Origine

Principalement bassin du Mississippi et régions associées aux États-Unis ; le référentiel distingue les formes pseudogeographica et kohnii. [S1]

Habitat complet

Herpeton propose au moins 120 ×60 ×60 cm pour un individu de taille appropriée et précise qu'une grande femelle demande davantage. Ce repère n'est pas une capacité automatique pour un groupe. [S4]

Paramètres et méthode de mesure

Eau en activité : 22-26 °C selon Herpeton [S4]

Mesure en immersion ; ne pas copier une température météorologique hivernale.

Surface de chauffe : 30-34 °C selon Herpeton [S4]

Garder des retraits et contrôler la température de l'eau séparément.

Repères de la première page

EAU : 22-26 °C

Herpeton [S4].

PLAGE : 30-34 °C

Herpeton [S4].

Ne pas confondre les graptémydes

The Reptile Database explique les changements de traitement de kohnii, tantôt séparée historiquement, aujourd'hui sous-espèce dans ce référentiel. [S1] Conserver le nom complet reçu et une identification photographique suffisamment claire facilite le rapprochement avec les bonnes publications. Les marques de tête ne doivent pas être interprétées seules depuis une image floue. Une tortue vendue simplement « tortue du Mississippi » reste insuffisamment identifiée.

Taille adulte, longévité et mode de vie

9-27,8 cm de carapace dans la synthèse universitaire du Nebraska. Austin donne, pour la forme nominale, environ 9-14,6 cm chez les mâles et 12,7-27,3 chez les femelles. [S2][S3]

Aucune moyenne ou longévité maximale suffisamment documentée n'est affichée dans cette sélection de sources.

Diurne, aquatique, utilisant rivières et eaux annexes avec des supports d'exposition. [S2][S4]

Un milieu ouvert, avec des refuges

L'université du Nebraska décrit de grandes rivières et des plans d'eau annexes. [S2] L'objectif d'aménagement n'est pas de fabriquer un torrent artificiel, mais de laisser circuler une tortue nageuse sans obstacles serrés. Réserver des secteurs dégagés et des écrans visuels permet de contrôler ce compromis. Un décor abondant qui réduit les virages peut faire perdre l'essentiel de l'espace théorique du bac.

La plateforme fait partie de l'habitat

Austin souligne l'importance de l'exposition, de la chauffe et des UVB. [S3] Une rampe accessible aux jeunes peut devenir trop légère ou trop étroite après croissance. Tester le support à la masse prévue et regarder les sorties à distance sont deux contrôles différents. La tortue doit pouvoir se placer entièrement hors de l'eau sans être obligée de rester au point le plus chaud.

Eau : une priorité mesurable

Austin considère la qualité de l'eau comme un point sensible pour cette espèce. [S3] Décrire le filtre et les nettoyages, mais aussi les résultats mesurés, évite de confondre un équipement coûteux avec une eau effectivement maîtrisée. Le choix d'un fond facile à inspecter peut simplifier l'entretien. Les restes piégés sous une plateforme et les zones sans circulation méritent une vérification après chaque réaménagement important.

Alimentation et croissance

Les observations universitaires décrivent une omnivore consommant notamment invertébrés et poissons ; Austin ajoute les végétaux aquatiques dans sa synthèse. [S2][S3] La liste de nourriture naturelle ne devient pas une ration calculée. La taille, la croissance et la consommation réelle doivent orienter le menu captif avec un professionnel. Le fait d'attendre près de la vitre ne permet pas, à lui seul, de conclure que la ration est insuffisante.

Une saison naturelle localisée

Au Nebraska, la fiche universitaire situe l'activité surtout d'avril à octobre et rapporte plusieurs pontes, avec 10-12 œufs dans la référence citée. [S2] Ces repères régionaux expliquent une biologie saisonnière ; ils ne fixent pas les dates d'un élevage chauffé. Noter ponte et éclosion séparément reste essentiel. La fiche n'indique pas de refroidissement ni de durée d'incubation à appliquer sans protocole spécialisé.

Précisions & sources

Graptémyde pseudogéographique

Observer sans provoquer les plongeons

Herpeton décrit des plongeons de fuite lorsqu'une graptémyde est surprise. [S4] Les passages proches du bac et la position des refuges peuvent donc modifier ce que l'on observe. Installer des obstacles sans arêtes et garder libres les trajets de fuite rend le dispositif plus lisible. Une tortue souvent immergée pendant les visites n'utilise pas nécessairement sa plage de la même façon lorsqu'elle est seule.

Prévoir la femelle et la durée

Si le sexe est inconnu, préparer l'installation pour la grande taille possible plutôt que promettre un petit aquarium définitif. La cohabitation n'est pas validée par le simple ajout de litres : conserver un moyen de séparation. Documents de provenance captive, identité et règles actuelles de détention doivent être vérifiés avant achat. Aucun prélèvement naturel ni relâcher ne fait partie d'un maintien responsable.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Prévoir la taille de la femelle.

[ ] Inspecter les trajets de plongeon.

[ ] Contrôler eau et plateforme.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Graptemys pseudogeographica
https://reptile-database.reptarium.cz/Graptemys/pseudogeographica
Consulté le 2026-10-26

[S2] University of Nebraska-Lincoln - False Map Turtle
https://herpneb.unl.edu/false-map-turtle/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Austin's Turtle Page - False Map
https://austinsturtlepage.com/Care/cs-falmap.htm
Consulté le 2026-10-26

[S4] Herpeton Academy - False Map Turtle
https://academy.herpeton.net/en/caresheets/turtles/graptemys-pseudogeographica/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : William L. Farr · CC BY-SA 4.0
Mississippi map turtles (Graptemys pseudogeographica kohni).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Aquaterrarium pour tortue aquatique : préparer un habitat fonctionnel

Alimentation d'une tortue aquatique : identifier les besoins avant le menu

Lampe pour terrarium : éclairage UVB, LED, chauffage et distances

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/graptemys-pseudogeographica/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.