

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent-roi à bandes grises

Lampropeltis alterna

Sud-ouest des États-Unis et nord du Mexique ; le plan du Nouveau-Mexique documente notamment le Trans-Pecos texan et le sud-est du Nouveau-Mexique. [S1][S2] Discret et surtout nocturne, utilisant fissures et abris souterrains. [S2]

Terrestre | Rochers et fissures

TAILLE ADULTE

51-90 cm habituels

Longueur totale ; maximum 146,7 cm TL [S1][S2].

LONGÉVITÉ

Non établie ici

Pas de moyenne spécifique retenue.

MODE DE VIE

Terrestre et discret

Fissures, sorties surtout nocturnes [S2].

01 Un habitat adapté

Refuges rocheux accessibles

Prévoir l’inspection sans extraire de force.

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**29-32 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**21-26 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Souris utilisées en captivité ; régime sauvage dominé par les lézards [S2].

04 L’humidité varie

À mesurer localement

Pas de pourcentage spécifique établi.

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas et présentation des proies · Sorties nocturnes observées · Mues et masse · Microclimats des refuges

Précisions & sources

Serpent-roi à bandes grises

Comprendre cette fiche

Lampropeltis alterna : comprendre les formes à bandes grises, organiser les refuges rocheux et préparer le suivi alimentaire des jeunes et des adultes.

Le serpent-roi à bandes grises est lié aux milieux rocheux et aux refuges profonds. Sa diversité de dessins attire l'attention, mais la provenance et l'alimentation déjà acquise sont des critères plus utiles pour préparer son accueil. [S1][S2]

Origine

Sud-ouest des États-Unis et nord du Mexique ; le plan du Nouveau-Mexique documente notamment le Trans-Pecos texan et le sud-est du Nouveau-Mexique. [S1][S2]

Habitat complet

Logement individuel avec refuges inspectables inspirés des fissures ; dimensions ajustées à l'individu, sans minimum spécifique validé ici.

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 29-32 °C

Repère général Lampropeltis, à affiner pour cette espèce. [S4]

Zone plus fraîche : 21-26 °C

Même cadre général ; pas une mesure de son habitat sauvage. [S4]

Humidité : Microclimats à mesurer

Aucun pourcentage propre à alterna établi dans ce dossier.

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 29-32 °C

Cadre général Lampropeltis [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 21-26 °C

Repère de genre [S4].

Formes alterna et blairi : une seule espèce

La Reptile Database classe blairi parmi les synonymes d'alterna et distingue cette espèce de L. mexicana. [S1] Les appellations de forme ou de localité ne doivent donc pas créer plusieurs fiches taxonomiques. Joe Forks décrit des dessins intermédiaires entre les formes traditionnellement nommées. [S3] Demandez une provenance écrite et conservez les photographies des parents lorsqu'elles existent. Un beau contraste de bandes peut servir à reconnaître l'individu, mais ne remplace ni un historique de lignée ni une vérification de son identité.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Le plan de conservation indique habituellement 51-90 cm de longueur totale ; le maximum taxonomique rapporté atteint 146,7 cm TL. [S1][S2]

Aucune durée moyenne suffisamment documentée dans les sources retenues ; engagement à prévoir sur le long terme.

Discret et surtout nocturne, utilisant fissures et abris souterrains. [S2]

Lire l'habitat sans reproduire une sécheresse extrême

Le plan du Nouveau-Mexique décrit l'accès aux fissures profondes dans des milieux rocheux ; les observations de surface sont souvent nocturnes et liées aux pluies estivales. [S2] Le mot désert ne signifie donc pas que l'animal reste exposé à la chaleur et à l'air sec toute la journée. Dans votre projet, distinguez décor visible et refuges réellement accessibles. Préparez plusieurs endroits où disparaître, avec des conditions que vous pouvez vérifier, plutôt qu'une façade rocheuse spectaculaire dont l'intérieur ne peut jamais être inspecté.

Installer des fissures utilisables et sûres

La valeur pratique d'un abri se juge à son accessibilité pour le serpent et pour l'entretien. Concevez les passages sans pincement, avec des éléments stables et démontables. Un serpent caché ne doit pas être extrait en tirant sur son corps. Réservez une zone dégagée pour les transferts et une procédure simple pour vérifier chaque refuge. Photographiez le montage avant de compléter le substrat : ce document aidera à retrouver les points d'appui et à constater un déplacement après un nettoyage ou une modification.

Chaleur et humidité : garder la portée des chiffres

Les deux températures affichées viennent d'un cadre de pratique commun à plusieurs Lampropeltis. [S4] Elles ne constituent pas une démonstration d'optimum pour toutes les localités d'alterna. Avant l'accueil, faites préciser le régime utilisé par le naisseur et vérifiez vos mesures dans les abris, aux surfaces accessibles et pendant la nuit. Notez séparément humidité de l'air et état du substrat. Une cachette en permanence évitée appelle une investigation ; elle ne prouve pas, à elle seule, que la température est responsable.

Alimentation : anticiper la préférence des jeunes

Le plan de conservation décrit surtout des lézards dans le régime sauvage et l'usage de souris domestiques en captivité. [S2] Cette différence rend l'historique alimentaire particulièrement précieux. Demandez des repas autonomes récents avec la proie que vous pourrez réellement fournir, sa taille et sa présentation. Évitez d'acheter un jeune en supposant qu'une transition sera automatique. Le registre doit distinguer offre et ingestion, puis indiquer les refus et l'évolution corporelle. Un problème persistant mérite l'aide du naisseur et d'un vétérinaire plutôt qu'une succession d'essais improvisés.

Précisions & sources

Serpent-roi à bandes grises

Comportement, discrétion et interventions

Joe Forks rapporte que les animaux passent une grande partie de leur temps hors de vue et que l'ophiophagie, quoique rare, a été observée en captivité. [S3] Le logement séparé facilite ici l'identification des repas et des déjections. Choisissez des moments d'observation compatibles avec les sorties, sans éclairer continuellement les refuges pour obtenir une activité visible. Lors d'un transfert, préparez le contenant fermé, l'accès et le trajet avant l'ouverture. Une réaction défensive ponctuelle doit être consignée avec son déclencheur, sans étiqueter définitivement le tempérament.

Reproduction : distinguer observation et protocole

L'espèce pond des œufs. Le plan de conservation souligne que beaucoup de connaissances reproductives viennent d'animaux captifs ; Forks rapporte des pontes de quatre à treize œufs dans son exposé d'élevage. [S1][S2][S3] Ce chiffre n'est ni une promesse ni un objectif pour une femelle. Les récits de refroidissement ne sont pas reproduits en mode d'emploi universel. Avant tout projet, prévoyez le suivi parental, un lieu de ponte, l'identification des œufs et les logements des jeunes, ainsi qu'une solution réaliste pour leur démarrage alimentaire.

Un suivi adapté à un animal souvent invisible

Consignez les sorties observées, les repas pris, les mues, les pesées et toute intervention dans les refuges. La stabilité du dispositif rend les comparaisons plus parlantes : si vous changez chauffage, substrat et cachettes simultanément, il devient difficile de comprendre une modification de comportement. Gardez une fiche datée de chaque réglage. Une mue incomplète, une régurgitation ou une dégradation corporelle appelle un examen du contexte et, si nécessaire, un avis vétérinaire. L'expérience requise tient surtout à cette capacité d'observer sans déranger et d'anticiper les jeunes difficiles.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier l'identité et la provenance.

[ ] Obtenir les preuves de prises autonomes.

[ ] Préparer des refuges démontables et stables.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Lampropeltis alterna
https://reptile-database.reptarium.cz/Lampropeltis/alterna
Consulté le 2026-10-26

[S2] Painter, Hayes et Stuart, NMDGF - Recovery and Conservation of the Gray-banded Kingsnake, 2002
https://wildlife.dgf.nm.gov/download/gray-banded-kingsnake-recovery-plan/?refresh=6a059a6133b951778752097&wpdmdl=43246
Consulté le 2026-10-26

[S3] Joe Forks - Gray-banded Kingsnake
https://www.kingsnake.com/king/alterna/alterna.html
Consulté le 2026-10-26

[S4] Mariah Healey, ReptiFiles - Kingsnake, Lampropeltis sp.
https://reptifiles.com/kingsnake
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Superchilum · CC BY-SA 4.0
Museo Doria - Lampropeltis alterna blairi 03.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Mon serpent refuse de manger : quoi vérifier et quand appeler

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Cachette pour reptile : quelle taille de cabane et quel emplacement choisir ?

Suivi du poids d'un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/lampropeltis-alterna/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.