


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent-roi moucheté

Lampropeltis holbrooki

Centre et sud des États-Unis, notamment bassin du Mississippi ; limites et anciennes zones d’intergradation à lire avec prudence. [S1] Activité diurne ou nocturne selon la saison ; nombreuses cachettes au sol. [S2]

Terrestre · Ophiophagie

TAILLE ADULTE

89-122 cm habituels

Jusqu’à 183 cm ; TL/SVL non précisé [S2].

LONGÉVITÉ

>14 ans rapportés

Captivité ; pas une moyenne [S2].

MODE DE VIE

Terrestre

Activité modulée par la saison [S2].

01 Un habitat adapté

Un individu par habitat

Cannibalisme documenté [S2][S3].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**29-32 °C [S4]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**21-26 °C [S4]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Souris d’élevage ; maîtriser la présentation lors d’une réponse vive [S3].

04 L’humidité varie

40-60 %

Cadre général à contextualiser [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas, refus et format des proies · Activité selon l’heure et la saison · Mues et masse · Réglages et emplacements de mesure

Précisions & sources

Serpent-roi moucheté

Comprendre cette fiche

Lampropeltis holbrooki : reconnaître le serpent-roi moucheté, prévoir un logement individuel et suivre ses proies, ses refuges et son activité saisonnière.

Le serpent-roi moucheté porte généralement de petites taches claires sur un fond sombre. Son régime peut comprendre d'autres serpents : un hébergement individuel et un suivi alimentaire précis sont des choix centraux pour sa maintenance. [S1][S2]

Origine

Centre et sud des États-Unis, notamment bassin du Mississippi ; limites et anciennes zones d'intergradation à lire avec prudence. [S1]

Habitat complet

Un serpent par logement ; circulation au sol, refuges accessibles et ouverture maîtrisée. [S2][S3]

Paramètres et méthode de mesure

Surface de chauffe : 29-32 °C

Cadre général Lampropeltis, non optimum individuel démontré. [S4]

Zone plus fraîche : 21-26 °C

Même cadre de pratique à mesurer sur place. [S4]

Humidité de référence : 40-60 %

Repère général du guide, à contextualiser. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 29-32 °C

Cadre général Lampropeltis [S4].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 21-26 °C

Repère de genre [S4].

Reconnaître l'espèce et son ancien nom

Lampropeltis getula holbrooki est un nom historique de l'espèce aujourd'hui retenue comme L. holbrooki. [S1] La coloration habituelle associe un fond sombre à de petits points clairs, mais les dessins des jeunes peuvent être davantage organisés en bandes. [S2] Une identification doit garder la provenance et l'âge en tête. Conservez les documents d'achat et la dénomination originale ; ne déduisez pas une hybridation ou une localité d'un seul motif. Les anciennes fiches du complexe getula doivent être relues dans ce contexte.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 89-122 cm habituellement selon le Missouri, avec des individus atteignant 183 cm ; convention TL/SVL non explicitée sur cette page. [S2]

Le Missouri rapporte un peu plus de 14 ans en captivité ; sa projection au-delà de 20 ans reste une estimation. [S2]

Activité diurne ou nocturne selon la saison ; nombreuses cachettes au sol. [S2]

Une écologie plus large qu'un décor unique

Le Missouri décrit l'espèce dans des prairies, lisières et secteurs boisés ou humides, avec utilisation de refuges sous les objets et dans des terriers. [S2] Cette diversité invite à préparer plusieurs fonctions dans l'habitat : circuler, se cacher et choisir une exposition différente. Un décor entièrement ouvert ne reproduit pas cette possibilité. Dessinez le parcours entre les refuges et les points d'eau, puis vérifiez que l'entretien reste faisable. La place réellement accessible compte davantage qu'une accumulation d'éléments décoratifs.

Logement individuel et organisation des ouvertures

Le cannibalisme est documenté, et KJ Lodrigue déconseille explicitement de maintenir deux animaux ensemble. [S2][S3] Prévoyez donc un dispositif distinct pour chaque serpent, y compris lors des nettoyages et des transports temporaires. Préparez le contenant avant d'ouvrir le terrarium et refermez les logements voisins. Le suivi devient aussi plus fiable : une proie disparue ou une déjection retrouvée appartient à un individu identifié. Cette organisation est particulièrement utile dans une collection où plusieurs serpents ont des horaires d'entretien semblables.

Températures et humidité : mesurer un gradient réel

Les valeurs du tableau sont des repères de genre issus d'un guide spécialisé. [S4] Elles ne représentent ni la température corporelle recherchée par chaque individu ni les extrêmes météorologiques de son aire. Vérifiez l'ambiance, les surfaces et les refuges avec des mesures séparées. Notez également la situation nocturne et la température de la pièce. Avant une modification, conservez la valeur précédente et son emplacement de mesure : sans cette précision, deux relevés apparemment différents peuvent simplement avoir été pris à des endroits différents.

Alimentation : une réponse vive n'est pas un besoin

Dans son expérience captive, Lodrigue utilise des souris d'élevage et décrit une réponse alimentaire énergique. [S3] Cela impose surtout une présentation maîtrisée et un registre clair, sans conclure qu'un animal qui frappe doit être nourri davantage. Demandez le format des prises précédentes et consignez les refus autant que les repas. Le régime sauvage comprenant d'autres serpents ne justifie pas d'en proposer en captivité. Gardez les mains hors de la trajectoire de prise et séparez clairement les gestes de nourrissage des interventions d'entretien.

Précisions & sources

Serpent-roi moucheté

Activité et réactions défensives

Au Missouri, l'activité de surface devient plus nocturne pendant les périodes chaudes ; la vibration de la queue et l'émission de musc sont décrites comme des défenses. [S2] Une séance de manipulation ne doit donc pas servir à vérifier une réputation de docilité. Notez les circonstances d'une réaction, puis ajustez l'organisation des interventions. Préférez des observations à distance à différentes heures pour comprendre les habitudes de l'individu. La disparition dans un refuge après une ouverture renseigne d'abord sur cette interaction, pas sur un caractère permanent.

Reproduction et accueil des jeunes

L'espèce pond des œufs. [S1] Les calendriers de terrain du Missouri et les expériences d'élevage publiées décrivent des situations différentes ; ils ne sont pas réunis ici en recette de reproduction. Avant tout rapprochement, prévoyez l'identification des parents, une surveillance effective et des logements immédiatement disponibles. Lodrigue signale que certains nouveau-nés démarrent difficilement sur souris. [S3] Il faut donc anticiper cette étape et l'accompagnement nécessaire, sans annoncer un nombre de jeunes, un rythme de ponte ou une réussite garantis.

Carnet, entretien et décision d'acquisition

Le registre peut associer repas, masse, mues, nettoyage et utilisation des refuges. Prenez les photographies corporelles dans des conditions comparables, et indiquez si une mesure a été faite avant ou après un repas. Un historique cohérent vaut mieux qu'une cible de poids sans fondement. Préparez également l'accès à un vétérinaire compétent avant l'acquisition. Une régurgitation répétée, une lésion ou une dégradation corporelle demande une évaluation ; ni la robustesse supposée du genre ni une température apparemment correcte ne suffisent à expliquer le problème.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Préparer un logement strictement individuel.

[ ] Organiser les transferts avant toute ouverture.

[ ] Vérifier les prises autonomes et le suivi antérieur.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Lampropeltis holbrooki
https://reptile-database.reptarium.cz/Lampropeltis/holbrooki
Consulté le 2026-10-26

[S2] Missouri Department of Conservation - Speckled Kingsnake
https://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/speckled-kingsnake
Consulté le 2026-10-26

[S3] KJ Lodrigue Jr. - Speckled Kingsnake
https://www.kingsnake.com/king/getula/holbrooki.html
Consulté le 2026-10-26

[S4] Mariah Healey, ReptiFiles - Kingsnake, Lampropeltis sp.
https://reptifiles.com/kingsnake
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Peter Paplanus · CC BY 2.0
Gefleckte Kettennatter (Lampropeltis holbrooki), Abwehrhaltung.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Peut-on faire cohabiter des reptiles dans le même terrarium ?

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Comment manipuler un serpent : gestes, moments et précautions

Suivi du poids d'un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/lampropeltis-holbrooki/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.