COMPRENDRE SON ESPÈCE

Paroedura picta

Paroedura picta



Gecko terrestre de Madagascar, aussi appelé gecko panthère ; un cas publié de parthénogenèse reste interprété avec ses limites [S2][S4].

Nocturne · Terrestre

TAILLE ADULTE

12-18 cm

Longueur totale du guide Dragonzoo [S3].

ACTIVITÉ

Nocturne

Terrestre, retraits en journée [S2][S3].

RÉGIME

Insectivore

Régime naturel et pratique captive [S2][S3].

01 Aménager son habitat

80 × 50 × 50 cm

Repère Dragonzoo ; substrat fouissable et refuges localement humides [S3].

02 Température & lumière

AIR · JOUR	**26-30 °C [S3]**
NUIT	**18-22 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Proies adaptées ; observer les femelles reproductrices et les prises des jeunes [S3].

04 L’humidité varie

40-60 %

Ambiance du guide ; prévoir des retraits plus humides [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Gecko panthère

Comprendre cette fiche

Le gecko panthère Paroedura picta : habitat malgache, refuges au sol, alimentation et pontes, avec un regard précis sur la parthénogenèse rapportée.

Le gecko panthère est un petit gecko terrestre de Madagascar. Une étude de 2024 rapporte une naissance sans contact avec un mâle, mais ce cas ne transforme pas l'espèce en lignée obligatoirement parthénogénétique [S4].

Origine

Ouest et sud de Madagascar ; la documentation de Tsinjoriake le décrit dans les fourrés épineux, la litière et sur le sable [S1][S2].

Habitat complet

Dragonzoo propose 80 × 50 × 50 cm, avec mélange de sable et terre ou argile et refuges localement humides ; repère commercial, pas norme universelle [S3].

Paramètres et méthode de mesure

Air de jour : 26-30 °C [S3]

Plage proposée par Dragonzoo ; distincte de sa chauffe localisée.

Nuit : 18-22 °C [S3]

Repère pratique attribué.

Humidité : 40-60 % [S3]

Plage d'ambiance du guide, avec retraits plus humides.

Repères de la première page

AIR · JOUR : 26-30 °C

Repère Dragonzoo [S3].

NUIT : 18-22 °C

Repère pratique attribué [S3].

Un nom à relier aux bonnes publications

La base actuelle retient Paroedura picta ; on rencontre encore Paroedura pictus ou Phyllodactylus pictus dans les textes anciens [S1]. Le nom français gecko panthère est attesté dans la documentation malgache [S2]. Une robe sélectionnée en élevage ne renseigne pas nécessairement sur une localité naturelle. Conserver le nom scientifique, l'identité des parents connue et la date de naissance aide à séparer les informations vérifiables des appellations esthétiques utilisées lors d'une vente.

Taille adulte, longévité et mode de vie

12-18 cm de longueur totale dans la fiche Dragonzoo ; la fiche naturaliste donne jusqu'à 9 cm de corps, mesure distincte [S2][S3].

Dragonzoo évoque plus de dix ans dans de bonnes conditions, sans présenter de registre ; la longévité moyenne demeure non établie ici [S3].

Terrestre et nocturne, recherchant les retraits en journée [S2][S3].

Litière, sable et refuges

La fiche de Tsinjoriake situe l'espèce dans les fourrés épineux du Sud et du Sud-Ouest [S2]. Un décor exclusivement vertical ne traduit donc pas ce mode de vie. On peut créer plusieurs chemins au sol entre abris et points de nourrissage, avec des reliefs bas stables. Il s'agit d'un choix d'aménagement fondé sur le caractère terrestre. Prévoir l'accès aux zones sous les refuges facilite le retrait des déchets et l'observation d'un éventuel site de ponte sans devoir poursuivre le gecko.

Climat mesuré plutôt qu'ambiance supposée

Dragonzoo distingue jour, nuit et une zone de chauffe localisée ; sa fiche propose également des refuges légèrement plus humides [S3]. Les chiffres publiés ne constituent pas des mesures météorologiques de Madagascar. Avant de les utiliser, préciser si le capteur mesure l'air, le sol ou l'intérieur d'une cachette. Le résultat peut changer fortement sous un abri proche du chauffage. Maintenir plusieurs options thermiques et vérifier les extrêmes de la journée est plus informatif qu'un unique relevé pris devant le terrarium.

Nourrir un petit chasseur

Le régime insectivore est décrit dans la source naturaliste [S2]. Dragonzoo cite grillons et petites blattes, avec compléments ; l'étude de reproduction utilise principalement des grillons dans son élevage [S3][S4]. Ces menus ne démontrent pas qu'un seul insecte couvre tous les besoins. Diversifier les proies disponibles et conserver leurs informations d'élevage permet de faire évaluer la ration. Pour les jeunes, observer la capture d'une proie réellement adaptée est préférable à augmenter simplement le nombre d'insectes déposés.

Une reproduction ordinaire à ne pas négliger

L'espèce pond habituellement des œufs, souvent par deux selon la documentation malgache [S1][S2]. La production répétée engage l'état de la femelle. Séparer des animaux ne garantit pas l'arrêt immédiat de toute ponte fertile, car les auteurs de 2024 rappellent aussi la rétention de sperme rapportée chez cette espèce [S4]. Cette distinction est importante pour interpréter une naissance : connaître toute l'histoire des contacts avec des mâles apporte plus qu'une simple date de séparation récente.

Précisions & sources

Gecko panthère

Le cas de parthénogenèse et sa portée

Sokhnenko, Doronin et Böhme décrivent une femelle isolée des mâles depuis la naissance, puis un jeune issu d'un œuf incubé. Ils interprètent ce cas comme une parthénogenèse facultative et précisent qu'une preuve génétique serait souhaitable [S4]. Il serait donc excessif d'annoncer une reproduction sans mâle certaine ou habituelle. Un œuf trouvé chez une femelle isolée ne permet pas de connaître son mécanisme de développement. Conserver dates, parenté et conditions reste indispensable pour documenter une observation comparable.

Incubation et préparation des jeunes

Dragonzoo rapporte 45-60 jours à 27 °C dans sa pratique [S3]. Le cas scientifique de 2024 utilise d'autres conditions ; on ne fusionne pas ces résultats en une recette unique. La durée d'incubation ne suffit pas à décider d'intervenir sur un œuf. Un projet reproductif exige des installations disponibles, une surveillance de la femelle et un protocole discuté avec un éleveur expérimenté. La précocité observée dans une publication ne constitue pas un âge conseillé pour mettre un animal à la reproduction.

Suivi et limites des recettes

L'intérêt du suivi est de rapprocher repas, silhouette, masse et pontes sans transformer chaque mesure en objectif. Pour une femelle, distinguer changement de masse autour d'une ponte et tendance durable aide à préparer une consultation. Les sources consultées donnent une histoire naturelle et quelques expériences captives, mais pas une comparaison de tous les substrats, de tous les éclairages ou de toutes les fréquences alimentaires. Les valeurs retenues restent donc attribuées à leur auteur et doivent être examinées avec l'installation réelle.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver le nom scientifique et l'origine documentée.

[ ] Vérifier les accès aux abris, à l'eau et à la nourriture.

[ ] Mesurer le gradient avant de confier l'installation à l'animal.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Paroedura picta
https://reptile-database.reptarium.cz/Paroedura/picta
Consulté le 2026-10-26

[S2] MERITE / PGM-E 2014 - Richesse biologique de la NAP Tsinjoriake, fiche Paroedura picta
https://www.environnement.mg/wp-content/uploads/2025/01/2-FICHE-TECHNIQUE-COMPLETE-richesse-biologique-NAP-TSinjoriake_A4_2.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] J. Strötzel et N. Strauß, Dragonzoo - Madagaskar-Großkopfgeckos
https://www.dragonzoo.de/infos/info_grosskopfgeckos.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] Sokhnenko, Doronin et Böhme 2024 - Parthenogenetic reproduction in Paroedura picta, dépôt auteur
https://www.researchgate.net/publication/387270295_Sokhnenko_DV_Doronin_IV_Bohme_W_Parthenogenetic_reproduction_in_the_ocelot_gecko_Paroedura_picta_Peters_1854_Squamata_Gekkonidae_Russian_Journal_of_Herpetology_Vol_31_No_6_2024_pp_392_-_394_DOI_103090
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Charles J. Sharp · CC BY-SA 4.0
Big-headed gecko (Paroedura picta) Arboretum d'Antsokay.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/paroedura-picta/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.