


COMPRENDRE SON ESPÈCE

# Phelsuma klemmeri

Phelsuma klemmeri

Ce petit Phelsuma du nord-ouest de Madagascar utilise notamment les bambous ; sa silhouette aplatie demande une fermeture soigneuse [S1][S2][S3].

Arboricole · Diurne

**TAILLE ADULTE**

## ≈ 9 cm

Queue comprise ; environ 4,5 cm museau-cloaque [S3].

**ACTIVITÉ**

## Diurne

Utilise bambous et arbres voisins [S2][S3].

**RÉGIME**

## Omnivore

Alimentation d'élevage décrite par la DGHT [S3].

## 01 Aménager son habitat

## 40 × 40 × 60 cm

Repère DGHT pour un couple, sans garantie de compatibilité [S3].

## 02 Température & lumière

| | |
|---|---|
| PARTIE HAUTE ÉCLAIRÉE | **30-35 °C [S2]** |
| PARTIE BASSE | **22-25 °C [S2]** |

Méthode et nuances : voir les précisions.

## 03 Bien nourrir

Petites proies et alimentation fruitée adaptée ; ne pas reprendre les anciennes recettes comme ration équilibrée [S2][S3].

## 04 L'humidité varie

## 60-80 %

Pratique d'Ulrike Anders ; ventilation et eau accessibles [S2].

**À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER**

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

# Précisions & sources

Phelsuma klemmeri

## Comprendre cette fiche

Bambous, petites proies, sécurité des ouvertures et suivi des pontes de Phelsuma klemmeri : une fiche qui distingue observations et pratiques d'élevage.

Phelsuma klemmeri est un très petit gecko malgache aplati, à tête jaune et bandes bleues. Son corps passe dans des interstices qu'un gecko plus massif ne pourrait franchir [S2].

## Origine

Nord-ouest de Madagascar, région du Sambirano ; l'espèce est décrite sous ce nom depuis 1991 [S1].

## Habitat complet

La DGHT propose 40 × 40 × 60 cm (largeur × profondeur × hauteur) pour un couple ; référence d'association, sans garantie de compatibilité [S3].

## Paramètres et méthode de mesure

Partie haute éclairée : 30-35 °C [S2]

Valeurs d'un élevage ; la source ne sépare pas air et surface.

Bas du terrarium : 22-25 °C [S2]

Zone plus fraîche du même élevage.

Humidité : 60-80 % [S2]

Repère captif d'Ulrike Anders, avec ventilation et accès à l'eau.

## Repères de la première page

PARTIE HAUTE ÉCLAIRÉE : 30-35 °C

Repère d'éleveuse ; méthode air/surface non distinguée [S2].

PARTIE BASSE : 22-25 °C

Zone fraîche du même élevage [S2].

## Une petite espèce bien distincte

La base taxonomique reconnaît Phelsuma klemmeri sans sous-espèce listée. Le nom honore l'herpétologue Konrad Klemmer [S1]. Sa silhouette très plate compte davantage pour l'aménagement que la seule longueur totale : portes coulissantes, passages de câbles et jonctions du couvercle doivent être examinés comme autant d'issues possibles. L'étiquette « petit gecko » ne dispense donc pas de concevoir un logement complet, avec différents supports et un accès sûr pour l'entretien [S2].

## Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 9 cm queue comprise ; la DGHT donne environ 4,5 cm du museau au cloaque [S3].

6-8 ans annoncés par la fiche d'élevage DGHT ; sans série de survie ni maximum documenté précisés [S3].

Diurne et arboricole, associé notamment aux bambous et arbres voisins [S2][S3].

## Bambous, feuillage et accès

La DGHT décrit un terrarium planté, des bambous horizontaux et verticaux et une bonne circulation d'air [S3]. Avant installation, vérifier l'intérieur des tubes, leurs arêtes et leur fixation. Une cavité visible au contrôle est plus facile à suivre qu'un refuge impossible à inspecter. En reliant plusieurs orientations, on permet au gecko de rejoindre une zone abritée sans devoir redescendre au sol ; conserver toutefois les grilles de ventilation dégagées.

## Éclairage et mesures comparables

Les températures indiquées ici proviennent du retour d'expérience d'Ulrike Anders, non d'une mesure universelle du milieu naturel [S2]. La DGHT insiste sur un éclairage lumineux et sur l'impossibilité de toucher les lampes brûlantes [S3]. Lors des essais, relever les valeurs sur les bambous réellement accessibles. Un appareil placé contre une vitre ou directement mouillé peut donner une image trompeuse du microclimat utilisé ; consigner son emplacement évite les comparaisons incohérentes.

## Boisson sans confinement humide

Anders observe l'utilisation des gouttelettes ainsi que d'une coupelle [S2]. Il faut distinguer la présence d'eau et le pourcentage d'humidité : un air humide n'atteste pas que le gecko a bu. Pour le suivi, regarder les surfaces disponibles après pulvérisation, puis leur évolution au cours de la journée. Une buée durable sur toute la façade doit conduire à contrôler l'aération et les apports d'eau, plutôt qu'à ajouter une nouvelle pulvérisation par habitude.

## Petites proies et compléments

La fiche DGHT cite plusieurs petits invertébrés et attire l'attention sur la complémentation des jeunes [S3]. Le retour d'élevage décrit aussi une composante fruitée [S2]. Les recettes anciennes contenant produits laitiers ou miel ne sont pas reprises comme alimentation de base. La décision pratique consiste à documenter ce qui est réellement proposé : espèce et taille des proies, produit complet éventuel, calcium et vitamines déjà inclus. Leur cumul ne doit pas être improvisé à partir de plusieurs fiches.

## Cohabitation : des récits contradictoires

Les appréciations de sociabilité diffèrent. La DGHT envisage certaines associations sous surveillance, tandis qu'Anders rapporte l'échec de ses essais avec plusieurs mâles, avec poursuites et morsures [S2][S3]. Cette divergence mérite d'être conservée. Une réputation de douceur ne garantit pas l'absence de conflit. Pour un groupe existant, observer l'accès individuel aux meilleurs supports et à la nourriture ; prévoir la séparation avant une introduction, et non après une blessure.

# Précisions & sources

Phelsuma klemmeri

## Reproduction et pièges des ouvertures

Anders décrit surtout des pontes de deux œufs dans les bambous et des durées d'incubation variables entre saisons [S2]. La DGHT souligne que les jeunes peuvent nécessiter une séparation avant la maturité [S3]. L'aplatissement du corps devient particulièrement important à ce stade : un passage apparemment fermé pour les adultes peut laisser fuir un nouveau-né. Les données consultées ne justifient pas de transformer une date d'éclosion théorique en intervention sur un œuf intact.

## Observer un individu, pas une réputation

Identifier chaque animal par des photographies datées aide à vérifier que tous sont observés, surtout dans une installation très plantée. Répertorier les refuges et les pontes rend le contrôle plus concret qu'un simple comptage occasionnel. La durée de vie annoncée par la DGHT reste un repère d'élevage [S3]. Aucune masse adulte cible robuste n'a été retenue ici ; une évolution individuelle documentée vaut mieux qu'une valeur empruntée à un autre Phelsuma.

## Checklist avant l'arrivée

[ ] Préparer plusieurs refuges accessibles avant l'arrivée.

[ ] Vérifier les mesures aux emplacements réellement fréquentés.

[ ] Conserver l'origine et les observations individuelles.

## Sources consultées

**[S1]** The Reptile Database - Phelsuma klemmeri
https://reptile-database.reptarium.cz/Phelsuma/klemmeri
Consulté le 2026-10-26

**[S2]** Ulrike Anders, IG Phelsuma - Haltungsbericht Phelsuma klemmeri
https://www.ig-phelsuma.de/phelsuma-klemmeri/
Consulté le 2026-10-26

**[S3]** Johannes Haller, DGHT Suisse - Blauer Bambus-Taggecko
https://dght-schweiz.ch/download/phelsuma-klemmeri.pdf
Consulté le 2026-10-26

## Photographie et licence

Photo : Brian Gratwicke · CC BY 2.0
Neon Day Gecko (Phelsuma klemmeri).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

## Articles complémentaires

Gecko diurne Phelsuma : observer sans multiplier les manipulations

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/phelsuma-klemmeri/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.