

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Phelsuma laticauda

Phelsuma laticauda

Petit gecko diurne de Madagascar et des îles voisines ; les populations introduites sont distinguées de son aire native [S1][S3].

Arboricole · Diurne

TAILLE ADULTE

10-13 cm

Longueur totale, forme nominale [S3].

ACTIVITÉ

Diurne

Arboricole [S3].

RÉGIME

Omnivore

Proies et composante fruitée [S2][S3].

01 Aménager son habitat

30 × 30 × 45 cm

Minimum pratique pour un individu ; davantage recommandé [S2].

02 Température & lumière

PERCHOIR DE CHAUFFE	**32 °C [S2]**
NUIT	**21-25 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Proies adaptées et préparation pour geckos omnivores ; vérifier la consommation effective [S2].

04 L’humidité varie

40-70 %

Moyenne d’ambiance variable, selon ReptiFiles [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Phelsuma laticauda

Comprendre cette fiche

Identifier Phelsuma laticauda, aménager ses perchoirs et suivre climat, repas et pontes, avec des repères d’élevage attribués et leurs limites.

Ce petit gecko diurne possède une nuque semée de jaune et une queue large. Les sous-espèces laticauda et angularis appartiennent ici à une seule fiche espèce [S1][S3].

Origine

Madagascar et îles voisines ; les populations introduites, notamment à Hawaï et Moorea, ne constituent pas son aire native [S1].

Habitat complet

ReptiFiles indique 30 × 30 × 45 cm pour un individu comme minimum pratique et recommande plus grand ; ce chiffre ne décrit pas un couple [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Perchoir de chauffe : 32 °C [S2]

Repère ReptiFiles ; sonde sur le support exposé.

Nuit : 21-25 °C [S2]

Plage de la source pratique, à mesurer après extinction.

Humidité : 40-70 % [S2]

Repère moyen au milieu du volume, avec variation journalière.

Repères de la première page

PERCHOIR DE CHAUFFE : 32 °C

Repère ReptiFiles, au support exposé [S2].

NUIT : 21-25 °C

Repère captif publié [S2].

Reconnaître l’animal et sa provenance

Le nom historique Pachydactylus laticauda figure dans la base taxonomique. La forme nominale présente habituellement trois marques rouges dorsales, tandis que angularis porte un dessin plus anguleux. Une couleur inhabituelle ne suffit donc pas à annoncer une nouvelle espèce ou à garantir une localité. Demander la désignation utilisée par l’éleveur, les parents connus et la date de naissance évite de transformer une hypothèse commerciale en donnée biologique [S1][S3].

Taille adulte, longévité et mode de vie

10-13 cm de longueur totale pour la forme nominale, queue comprise, selon IG Phelsuma [S3].

AnAge compile un maximum enregistré de 8,7 ans en captivité ; ce record de collection ne représente pas une espérance moyenne [S4].

Diurne, grimpeur ; utilise aussi plantations et bâtiments dans certaines localités [S3].

Construire des trajets dans la hauteur

Peter Krause décrit des bambous verticaux et horizontaux associés à des plantes et à une paroi de liège. Cette organisation fournit des supports de déplacement autant que des retraits visuels [S3]. Pour préparer le décor, suivre mentalement le parcours entre refuge, nourriture et zone éclairée : une branche isolée au centre ne remplit pas la même fonction qu’un réseau continu. Garder aussi une ouverture accessible pour changer les récipients sans poursuivre le gecko.

Mesurer lumière et chaleur

Le repère de chauffe publié par ReptiFiles concerne un support où l’animal se pose. La source signale aussi les brûlures possibles lorsque le gecko grimpe sous le grillage proche d’une lampe [S2]. Vérifier les positions les plus hautes est donc prioritaire. Noter séparément le lieu, l’heure et la méthode de mesure ; une température relevée près du sol ne permet pas de conclure que le plafond est sûr.

Eau, humidité et entretien

La plage hygrométrique publiée est une moyenne d’ambiance, pas une consigne de saturation permanente [S2]. Une observation utile consiste à relever l’humidité avant puis après la pulvérisation, en même temps que l’état réel des feuilles. L’eau déposée doit rester accessible sans rendre les supports glissants ou les aliments détrempés. Repérer les zones où les déjections s’accumulent sous les perchoirs simplifie un entretien ciblé, sans démonter systématiquement toute l’installation.

Nourrir et documenter les choix

Le régime captif décrit associe proies et préparation adaptée aux geckos omnivores [S2]. Krause rapporte lui aussi des insectes et une composante fruitée dans son élevage [S3]. Les anciennes recettes ne sont pas reproduites comme ration équilibrée. Photographier l’étiquette d’un aliment complet, sa dilution et les compléments utilisés permet de faire vérifier le menu. Un récipient vide peut indiquer une prise alimentaire, mais aussi un renversement : observer la consommation garde tout son intérêt.

Comportement et précautions

La petite taille et l’activité diurne facilitent l’observation sans rendre l’animal manipulable à volonté. ReptiFiles distingue l’entretien d’un seul gecko des groupes reproducteurs [S2]. Pour un projet individuel, les interactions se limitent ainsi aux besoins réels de l’animal. Lors d’un transfert nécessaire, préparer le contenant et fermer la pièce avant d’ouvrir le terrarium. Une coloration isolée reste une information descriptive ; elle ne prouve ni bonne santé ni dominance.

Précisions & sources

Phelsuma laticauda

Pontes et jeunes

Dans l’élevage de Krause, les femelles déposaient deux œufs dans des aisselles foliaires ou des bambous ouverts, avec des intervalles variables selon la saison. Il rapporte 45-50 jours d’incubation à 26-28 °C sans baisse nocturne : c’est un résultat de cet élevage, pas un délai universel [S3]. La base taxonomique signale une détermination sexuelle influencée par la température [S1]. Aucun protocole destiné à produire un sexe particulier n’est déduit de cette seule mention.

Suivi et limites documentaires

Conserver les dates de ponte, de mue et les observations de chasse aide à relier un changement à son contexte. Comparer les masses dans des conditions semblables est plus utile qu’un chiffre sans historique. La longévité d’AnAge concerne un maximum captif documenté, avec une qualité de données indiquée acceptable [S4]. Elle ne permet ni de dater un adulte acheté sans historique, ni de calculer le temps qu’il lui reste à vivre.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer plusieurs refuges accessibles avant l’arrivée.

[ ] Vérifier les mesures aux emplacements réellement fréquentés.

[ ] Conserver l’origine et les observations individuelles.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Phelsuma laticauda
https://reptile-database.reptarium.cz/Phelsuma/laticauda
Consulté le 2026-10-26

[S2] ReptiFiles - Gold Dust Day Gecko Care
https://reptifiles.com/gold-dust-day-gecko
Consulté le 2026-10-26

[S3] Peter Krause, IG Phelsuma - Phelsuma laticauda
https://www.ig-phelsuma.de/phelsuma-laticauda/
Consulté le 2026-10-26

[S4] AnAge - Phelsuma laticauda
https://hagr.ageing-map.org/species/entry.php?species=Phelsuma_laticauda
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Christine Stone · CC0
Phelsuma laticauda 444477383.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Gecko diurne Phelsuma : observer sans multiplier les manipulations

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/phelsuma-laticauda/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.