

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Phelsuma standingi

Phelsuma standingi

Grand gecko diurne du sud-ouest de Madagascar, associé à des formations sèches et épineuses [S1][S3][S4].

Arboricole · Diurne

TAILLE ADULTE

20-28 cm

Longueur totale selon le zoo de Liberec [S4].

ACTIVITÉ

Diurne

Arboricole de formations sèches [S3][S4].

RÉGIME

Omnivore

Insectes et matières végétales décrits au zoo [S4].

01 Aménager son habitat

60 × 60 × 120 cm

Minimum ReptiFiles pour un individu ; structurer la hauteur [S2].

02 Température & lumière

PERCHOIR DE CHAUFFE	**32-35 °C [S2]**
NUIT	**22-23 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Proies et composante végétale adaptées ; le régime sauvage demeure imparfaitement décrit [S3][S4].

04 L’humidité varie

40-75 %

Moyenne d’ambiance ; variation journalière à conserver [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Phelsuma standingi

Comprendre cette fiche

Comprendre Phelsuma standingi : grand gecko diurne des forêts sèches, habitat vertical, alimentation captive et reproduction replacée dans son contexte.

Ce grand Phelsuma change d'aspect avec l'âge : les bandes marquées des jeunes deviennent un dessin plus irrégulier chez les adultes. Il habite des forêts sèches malgaches [S2][S3].

Origine

Sud-ouest de Madagascar ; la localité type a été précisée près de l'Onilahy [S1].

Habitat complet

ReptiFiles recommande au moins 60 × 60 × 120 cm pour un individu et davantage si possible ; volume à structurer sur toute la hauteur [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Perchoir de chauffe : 32-35 °C [S2]

Sonde fixée au support sous la lampe, selon ReptiFiles.

Nuit : 22-23 °C [S2]

Repère captif publié, distinct des maxima diurnes.

Humidité : 40-75 % [S2]

Moyenne au milieu du terrarium, variable dans la journée.

Repères de la première page

PERCHOIR DE CHAUFFE : 32-35 °C

Repère captif ReptiFiles [S2].

NUIT : 22-23 °C

Valeurs nocturnes du même guide [S2].

Identité et différences d'âge

Phelsuma standingi demeure le nom accepté dans la base taxonomique ; aucun changement de genre n'est nécessaire pour lire les sources anciennes [S1]. Les jeunes rayés et les adultes marbrés ne sont pas deux espèces. Le zoo de Liberec décrit des coussinets adhésifs qui rendent possibles les déplacements verticaux [S4]. Pour identifier un animal sans historique, associer des photos de l'ensemble du corps au nom du cédant ; la couleur seule est insuffisante.

Taille adulte, longévité et mode de vie

20-28 cm de longueur totale, queue comprise, selon le zoo de Liberec ; il ne s'agit pas de la longueur du seul tronc [S4].

Le zoo Henry Vilas indique 12 ans en zoo ; ReptiFiles avance 15-20 ans avec de bons soins. Ces valeurs de nature différente ne sont pas une moyenne commune [S2][S3].

Arboricole et diurne, dans des formations sèches et épineuses ; les mâles défendent leur espace [S3][S4].

Un milieu sec n'est pas un décor vide

Henry Vilas Zoo situe l'espèce dans des forêts décidues sèches et des fourrés épineux [S3]. L'arboricolie reste centrale : reproduire seulement un sol sablonneux manquerait les supports qu'elle utilise. Prévoir des axes solides, des cavités et des zones visuellement protégées permet d'organiser le volume. La disponibilité d'une grande façade ne remplace pas cette structure ; vérifier que les branches ne tournent pas lorsque l'animal prend appui avant de considérer le logement prêt.

Chaleur et lumière accessibles au choix

La recommandation ReptiFiles distingue une zone éclairée de chauffe, des secteurs moins chauds et une nuit plus fraîche [S2]. Les valeurs doivent accompagner un emplacement, pas simplement être affichées sur un thermostat. Un adulte peut occuper des supports très différents dans la même journée. Reporter les points de mesure sur une photographie du décor permet de comparer les résultats après remplacement d'une lampe ou déplacement d'une branche, sans confondre changement matériel et variation biologique.

Eau et entretien des surfaces

Le repère d'humidité couvre une variation journalière et spatiale ; il ne signifie pas que les arbres du milieu naturel restent continuellement détrempés [S2][S3]. Examiner les cavités après pulvérisation et l'état des supports de repos donne une information complémentaire au capteur. Prévoir des éléments que l'on peut nettoyer sans chasser le gecko de refuge en refuge. Les coupelles et plantes doivent rester inspectables ; un décor naturaliste n'est pas un système sans entretien.

Alimentation : ce qui est observé et supposé

Le zoo de Liberec mentionne invertébrés, nectar, pollen et fruits [S4]. Henry Vilas Zoo reste plus prudent sur le régime sauvage précis, décrit comme encore imparfaitement connu [S3]. Cette nuance compte : une liste d'aliments possibles n'en fixe pas les proportions. En captivité, ReptiFiles propose proies et préparation pour geckos omnivores [S2]. Suivre l'aliment effectivement consommé et sa composition évite d'assimiler une purée de fruits à un produit complet.

Vie en couple et précautions

Le zoo de Liberec rapporte une vie en couples et une saison de reproduction locale [S4]. ReptiFiles présente les couples comme une pratique d'élevage nécessitant davantage de place [S2]. Le choix éditorial pour une simple observation est de ne pas imposer une reproduction permanente. En présence de deux individus, contrôler les accès séparés aux retraits, aux repas et à la lumière. Une proximité régulière ne suffit pas à exclure une compétition silencieuse.

Précisions & sources

Phelsuma standingi

Œufs et jeunes

L’espèce est ovipare [S1]. Henry Vilas Zoo décrit un ou deux œufs par ponte et une reproduction saisonnière, avec des jeunes qui ne reçoivent pas de soins parentaux [S3]. Liberec signale également deux œufs et une période allant de l’automne au début du printemps austral [S4]. Ces observations décrivent le cycle biologique ; elles ne constituent pas une prescription d’incubation domestique. Préparer l’hébergement et l’identification des jeunes reste nécessaire avant toute mise en reproduction.

Un engagement suivi dans le temps

Photographier les mues, noter les repas et conserver l’évolution de la masse permet de repérer une tendance sans chercher un poids universel. Les chiffres de longévité des sources ne sont pas directement comparables : fiche de zoo et estimation pratique ne décrivent pas nécessairement la même population [S2][S3]. La destruction de l’habitat et les prélèvements sont signalés par le zoo [S3]. Une provenance documentée et des animaux nés en captivité ont donc une importance concrète.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Préparer plusieurs refuges accessibles avant l’arrivée.

[ ] Vérifier les mesures aux emplacements réellement fréquentés.

[ ] Conserver l’origine et les observations individuelles.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Phelsuma standingi
https://reptile-database.reptarium.cz/Phelsuma/standingi
Consulté le 2026-10-26

[S2] ReptiFiles - Standing’s Day Gecko Care
https://reptifiles.com/standings-day-gecko
Consulté le 2026-10-26

[S3] Henry Vilas Zoo - Standing’s Day Gecko
https://www.henryvilaszoo.gov/animal/standings-day-gecko/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Zoo Liberec - Felsuma Standingova
https://zooliberec.cz/zvirata-u-nas/felsuma-standingova/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Hectonichus · CC BY-SA 3.0
Gekkonidae - Phelsuma standingi.JPG

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Gecko diurne Phelsuma : observer sans multiplier les manipulations

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Insectes nourriciers : choisir les proies et organiser leur préparation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/phelsuma-standingi/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.