
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Phyllobate terrible

Phyllobates terribilis



Forêts humides de Colombie, pays auquel l'espèce est endémique selon le zoo de Sapporo. [S3] La carte d'un pays ne doit pas être assimilée à une occupation de tout son territoire. Diurne et principalement liée aux retraits du sol forestier. [S2]

Origine documentée | Sol drainé

TAILLE

4,5-4,7 cm

Museau-cloaque, profil CC [S1].

LONGÉVITÉ

≈ 10 ans

Repère captif du zoo de Sapporo [S3].

MODE DE VIE

Diurne

Refuges du sol [S2].

01 Couple compatible

60 × 45 × 45 cm

Point de départ Herpeton, non garantie de cohabitation [S2].

02 Température & lumière

AIR JOUR	**21-24 °C [S2]**
AIR NUIT	**18-21 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Drosophiles et grillons adaptés ; disponibilité régulière à préparer [S2].

04 L'humidité varie

80-100 %

Repère Herpeton, avec ventilation et drainage [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Lignée · Repas · Microclimat · Reproduction

Précisions & sources

Phyllobate terrible

Comprendre cette fiche

Phyllobate terrible : comprendre le sol forestier, les gradients, les repas et les soins paternels, en distinguant captivité et défense chimique naturelle.

Phyllobates terribilis est une grenouille colombienne de la famille des Dendrobatidés. Citizen Conservation lui consacre un guide de reproduction en captivité. [S1] Le nom « terrible » renvoie à sa défense chimique ; une présentation sérieuse doit surtout distinguer provenance, milieu de vie et conditions réelles d'élevage.

Origine

Forêts humides de Colombie, pays auquel l'espèce est endémique selon le zoo de Sapporo. [S3] La carte d'un pays ne doit pas être assimilée à une occupation de tout son territoire.

Habitat complet

Herpeton propose 60 × 45 × 45 cm pour un couple compatible, avec davantage de surface pour un groupe. C'est un point de départ attribué, pas une garantie de cohabitation. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Air, maintien : 21-24 °C le jour et 18-21 °C la nuit selon Herpeton [S2]

Mesurer à hauteur des animaux, notamment sous l'éclairage.

Gradient documenté : Sol frais 22-24 °C dans le guide Citizen Conservation [S1]

Ses zones exposées plus chaudes ne sont pas une consigne pour tout le terrarium.

Humidité : 80-100 % dans le guide Herpeton [S2]

Avec ventilation et sol drainé ; ce repère ne signifie pas surfaces constamment noyées.

Repères de la première page

AIR JOUR : 21-24 °C

Repère Herpeton [S2].

AIR NUIT : 18-21 °C

Repère Herpeton [S2].

Séparer nom, teinte et filiation

Le guide Herpeton distingue notamment des lignées jaunes, orange et pâles, tout en les rattachant à la même espèce. [S2] Conserver les informations d'origine permet de ne pas remplacer une filiation inconnue par une simple ressemblance. Une nuance observée sous une lampe différente n'est pas une identification nouvelle. Lors d'une cession, transmettre ce qui est documenté et signaler ce qui reste inconnu est plus utile qu'un nom de variété ajouté après coup.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Citizen Conservation indique 4,5-4,7 cm de longueur museau-cloaque dans son profil ; cette mesure exclut les pattes et n'est pas présentée comme maximum absolu. [S1]

Le zoo de Sapporo donne environ 10 ans en captivité, sans description d'un suivi individuel. Ce repère n'est ni une moyenne démontrée ni une garantie. [S3]

Diurne et principalement liée aux retraits du sol forestier. [S2]

Comprendre les deux lectures thermiques

Citizen Conservation décrit un gradient comprenant un sol plus frais et des secteurs exposés plus chauds. [S1] Herpeton donne une plage d'air plus étroite. [S2] Il faut donc comparer des mesures prises au même endroit, et non opposer deux nombres sans contexte. Une valeur élevée près d'une lampe ne doit pas devenir la consigne de la totalité du bac. Avant l'été, vérifier que les retraits les moins exposés restent effectivement disponibles.

Litière et drainage remplissent des rôles distincts

Herpeton associe litière, refuges bas, drainage et ventilation. [S2] Dans un projet concret, prévoir l'évacuation de l'eau avant de fermer le décor. Une couche de feuilles offre des surfaces et des retraits ; elle ne corrige pas une réserve inférieure qui déborde. Les endroits utilisés pour distribuer les aliments doivent rester accessibles au nettoyage, tout en permettant à une grenouille de se retirer sans traverser tout un espace ouvert.

Organiser les repas autour de proies fiables

Le guide spécialisé utilise de petites proies cultivées, notamment drosophiles et grillons adaptés. [S2] La préparation du terrarium doit inclure leur disponibilité régulière et une solution de secours en cas d'échec d'une culture. Répartir les points de distribution aide à observer l'accès de chaque animal. Un programme nutritionnel cohérent doit tenir compte des produits réellement employés ; multiplier les suppléments au hasard ne permet pas d'évaluer ce que la grenouille reçoit.

Défense chimique et origine inconnue

Le Smithsonian explique, dans son dossier sur les dendrobatidés, le rôle de l'alimentation naturelle dans l'acquisition de certaines toxines et cite la batrachotoxine de P. terribilis. [S4] Cette information ne rend pas acceptable une manipulation destinée à prouver qu'un animal est inoffensif. Une provenance ou un régime antérieur inconnus doivent rester considérés comme inconnus. L'observation derrière la vitre et le transfert dans un récipient évitent les contacts de démonstration avec la peau.

Précisions & sources

Phyllobate terrible

Une séquence reproductive particulière

Citizen Conservation décrit une reproduction sans amplexus : le mâle dépose du sperme sur le support, puis la femelle dépose les œufs. [S1] La présence d'un couple ne garantit pas que cette séquence soit menée à terme. Un support de ponte doit pouvoir être inspecté sans être régulièrement retourné. Documenter la séquence observée permet de distinguer une parade, un dépôt et un développement effectif, sans annoncer un succès dès les premiers comportements.

Le mâle intervient après la ponte

Le même guide rapporte des soins du mâle aux œufs et le transport des têtards vers l'eau. [S1] Le bac destiné aux adultes ne constitue donc pas à lui seul un plan complet pour les jeunes. Prévoir les contenants, leur entretien et les ressources alimentaires avant une reproduction évite de devoir improviser après l'éclosion. Le nombre de larves visibles à une date précise doit rester distinct du nombre total d'œufs déposés.

Un projet à préparer sur plusieurs années

L'ordre de grandeur proposé par Sapporo implique un engagement qui dépasse la réussite d'une première installation. [S3] Anticiper une absence, une panne d'éclairage et un manque de proies rend le maintien plus robuste. Choisir des animaux d'origine captive documentée et vérifier les obligations applicables avant acquisition ou transport. Cette synthèse n'encourage aucun prélèvement naturel, ne propose pas de relâcher et ne fournit ni diagnostic ni traitement à partir d'une couleur ou d'une posture.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Préparer les cultures de proies.

[ ] Contrôler les retraits frais.

[ ] Éviter les manipulations de démonstration.

Sources consultées

[S1] Citizen Conservation - Breeding Guidelines Phyllobates terribilis, juillet 2024
https://citizen-conservation.org/wp-content/uploads/2024/10/CC-Breeding-Guidelines_Phyllobates-terribilis_07-2024.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S2] Herpeton Academy - Phyllobates terribilis
https://academy.herpeton.net/en/caresheets/amphibians/phyllobates-terribilis/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Zoo de Sapporo, Maruyama - Phyllobates terribilis
https://www.city.sapporo.jp/zoo/087-j.html
Consulté le 2026-10-26

[S4] Smithsonian National Zoo - Poison frogs
https://nationalzoo.si.edu/animals/poison-frogs
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : H. Zell · CC BY-SA 3.0
Phyllobates terribilis 01.JPG

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Quarantaine des amphibiens : préparer un accueil séparé

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Que mange une grenouille en captivité ? Aliments et repas

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/phyllobates-terribilis/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.