
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Pleurodèle de Waltl

Pleurodeles waltl



Péninsule Ibérique et nord du Maroc. Amphibien aquatique fréquentant des eaux calmes ou lentes, souvent végétalisées. [S1][S2]

Eau fraîche | Refuges végétalisés

TAILLE
Jusqu'à≈30 cm
Longueur totale, musée d'Évora [S2].

LONGÉVITÉ
Non chiffrée ici
Pas de suivi captif précis retenu.

MODE DE VIE
Surtout aquatique
Sortie terrestre à prévoir [S3].

01 Milieu principal

Aquarium aménagé

Végétation et petite zone émergée [S3].

02 Température & lumière

EAU	**Sous 21 °C [S3]**
COURANT	**Faible [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Vers de terre et aliments formulés appropriés ; consommation observée [S3].

04 L'humidité varie

Eau contrôlée

Filtration, restes et température ; pas de cible RH terrestre.

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER
Eau · Repas · Croissance · Reproduction

Précisions & sources

Pleurodèle de Waltl

Comprendre cette fiche

Pleurodèle de Waltl : taille, aquarium frais, accès à la surface, défense des côtes et parade, avec limites des conseils de maintien clairement indiquées.

Pleurodeles waltl est un grand triton surtout aquatique, originaire de la péninsule Ibérique et du nord du Maroc. Le nom waltl est retenu par Amphibian Species of the World ; les graphies waltli et waltlii apparaissent dans des textes anciens. [S1] Sa robustesse apparente ne dispense pas d'une eau adaptée.

Origine

Péninsule Ibérique, en dehors de plusieurs secteurs septentrionaux, et nord du Maroc. Le musée universitaire d'Évora décrit des eaux calmes ou lentes, souvent végétalisées. [S1][S2]

Habitat complet

Aquarium structuré avec végétation, refuges et accès à une petite zone émergée. Caudata Culture propose 15-20 cm d'eau hors reproduction ; la surface utilisable reste à prévoir selon l'adulte. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Eau : Sous 21 °C dans le guide Caudata Culture [S3]

Conseil attribué ; les tolérances extrêmes ne sont pas des objectifs de maintien.

Courant : Eaux calmes ou lentes [S2]

Prévoir une filtration qui ne transforme pas tout le bac en zone de turbulence.

Sortie : Accès émergé disponible [S3]

Vérifier le trajet réel et la fermeture du couvercle.

Repères de la première page

EAU : Sous 21 °C

Guide Caudata Culture [S3].

COURANT : Faible

Milieux calmes ou lents décrits [S2].

Un nom et une aire à préciser

Le référentiel actuel permet de distinguer waltl des autres espèces de Pleurodeles. [S1] Une fiche disant simplement « triton espagnol » ne suffit pas à identifier un animal ni sa provenance. La présence naturelle au Maroc évite aussi de réduire artificiellement l'aire à l'Espagne. Conserver l'orthographe actuelle et les anciennes graphies comme aides de recherche rend les documents comparables sans créer plusieurs fiches pour le même taxon.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Jusqu'à environ 30 cm de longueur totale dans la notice du musée d'Évora. Caudata Culture présente 15-20 cm comme taille fréquente en captivité, sans en faire un maximum. [S2][S3]

Aucune longévité étayée par un suivi précisément décrit n'a été retenue parmi les sources ouvertes ; un âge captif garanti n'est donc pas affiché.

Aquatique, avec utilisation possible de retraits terrestres humides lorsque les points d'eau naturels s'assèchent. [S3]

La végétation sert plusieurs fonctions

Le musée d'Évora décrit des milieux aquatiques variés avec végétation et des pontes fixées sur plantes ou pierres. [S2] Les supports ne sont donc pas uniquement décoratifs : ils offrent des retraits, des points de repos et, en contexte reproductif, des sites de dépôt. Dans un aquarium, leur installation doit laisser une zone de circulation visible. Une masse végétale trop difficile à inspecter peut cacher des restes ou un animal coincé.

Relier le fond à la surface

Le guide spécialisé prévoit une petite partie émergée. [S3] Sa présence sur la liste du matériel ne suffit pas : il faut suivre le trajet du triton, vérifier les pentes et repérer les bords glissants. L'accès à l'air doit rester simple lorsque les plantes poussent ou que le niveau varie. Les sorties techniques et les passages de tuyaux doivent être fermés, sans supprimer la ventilation nécessaire au-dessus de l'eau.

Eau fraîche et nettoyage mesurable

La recommandation de température provient de Caudata Culture et non d'un calcul à partir du climat ibérique. [S3] Mesurer l'eau directement, notamment aux heures chaudes, permet de vérifier ce que subit l'animal. Le filtre, la nourriture et les déchets doivent être suivis ensemble : un débit stable ne prouve pas l'absence de pollution dissoute. Le choix d'un fond accessible facilite le retrait ciblé des restes sans devoir refaire entièrement le bac.

Alimentation opportuniste, ration organisée

Caudata Culture décrit une consommation d'invertébrés et recommande notamment les vers de terre et des aliments formulés adaptés. [S3] Cela invite à diversifier les ressources, sans transformer toute proie acceptée en base du régime. Préparer les portions pour chaque individu facilite le repérage d'une concurrence. Les aliments tombés derrière un refuge doivent être distingués de ceux réellement ingérés ; l'appétit apparent ne donne pas directement la quantité consommée.

Une défense qu'il ne faut pas provoquer

Les saillies orangées latérales correspondent aux extrémités des côtes. Le musée décrit leur rôle dans une défense où les côtes peuvent traverser la peau. [S2] Il n'est pas nécessaire de comprimer ou saisir l'animal pour illustrer ce mécanisme. Le transfert doit privilégier un récipient adapté, en limitant le contact. Une photographie de détail peut être réalisée à travers la vitre, sans faire apparaître les côtes volontairement.

Précisions & sources

Pleurodèle de Waltl

Parade et développement

Le guide spécialisé décrit une prise de la femelle par le mâle, puis une séquence conduisant au dépôt et à la récupération d’un spermatophore. Les œufs sont placés parmi la végétation. [S3] Ce comportement demande de l’espace et ne garantit pas la fécondation de chaque œuf. Prévoir des contenants et des proies pour les larves avant l’accouplement évite de découvrir trop tard que le bac des adultes ne suffit pas à tout l’élevage.

Préserver le milieu et les animaux

Le musée universitaire relie les menaces à la disparition ou la modification des points d’eau, à la pollution et aux espèces introduites. [S2] La fiche ne propose donc aucun prélèvement naturel ni relâcher de surplus. Une origine captive documentée et une vérification des règles de détention sont nécessaires avant le projet. Les manipulations expérimentales de température utilisées dans la recherche sur le développement ne constituent pas des conseils d’élevage et sont exclues ici.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier accès à la surface.

[ ] Prévoir séparation des jeunes.

[ ] Ne pas provoquer la défense des côtes.

Sources consultées

[S1] Amphibian Species of the World - Pleurodeles waltl
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Caudata/Salamandridae/Pleurodelinae/Pleurodeles/Pleurodeles-waltl
Consulté le 2026-10-26

[S2] Universidade de Évora, Museu Virtual da Biodiversidade - Pleurodeles waltl
https://museubiodiversidade.uevora.pt/elenco-de-especies/biodiversidade-actual/animais/cordados/anfibios/pleurodeles-waltl/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Caudata Culture - Pleurodeles waltl
https://www.caudata.org/cc/species/Pleurodeles/P_waltl.shtml
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Diego González Dopico · CC BY 4.0
Pleurodeles waltl 455676362.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Triton ou salamandre : aquarium ou terrarium selon l’espèce ?

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Quarantaine des amphibiens : préparer un accueil séparé

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pleurodeles-waltl/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.