COMPRENDRE SON ESPÈCE

Pogona henrylawsoni

Pogona henrylawsoni



Petit agamidé du Queensland ; Pogona brevis est un synonyme et « rankini » un ancien nom informel [S1][S4].

Diurne · Terrestre

TAILLE ADULTE

≈ 30 cm

Total ; environ 13 cm museau-cloaque selon BGSU [S2].

ACTIVITÉ

Diurne

Espèce distincte de P. vitticeps [S1][S2].

RÉGIME

Omnivore

Insectes et végétaux [S2][S3].

01 Aménager son habitat

Sol, lumière et refuges

Petites dimensions des guides anciens non retenues comme minimum validé [S2][S3].

02 Température & lumière

AMBIANCE PUBLIÉE **26-29 °C [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Insectes adaptés et végétaux identifiables ; vérifier les prises et raisonner les compléments avec l'éclairage [S2][S3].

04 L'humidité varie

20-40 %

Repère de Maritime Geckos, issu de son expérience [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Pogona henrylawsoni

Comprendre cette fiche

Identifier Pogona henrylawsoni et ses anciens noms, préparer lumière, refuges et repas, avec les limites des données de reproduction et des guides captifs.

Ce petit agamidé diurne du Queensland est une espèce distincte. « Rankin » est un nom d'usage ; Pogona brevis est un synonyme confirmé par le catalogue du Western Australian Museum [S1][S4].

Origine

Centre du Queensland, en Australie ; la localité type se trouve à l'ouest de Richmond [S1].

Habitat complet

Installation terrestre éclairée avec supports exposés et refuges ; les petites dimensions des guides anciens ne sont pas retenues comme minimum validé [S2][S3].

Paramètres et méthode de mesure

Ambiance publiée : 26-29 °C [S2]

Repère de la fiche universitaire, distinct du support chauffant.

Chauffe : À préciser par mesure

Les sources décrivent le point chaud sans méthode assez précise pour une consigne unique [S2][S3].

Humidité d'élevage : 20-40 % [S3]

Fourchette revendiquée par Maritime Geckos, sans essai contrôlé.

Nuit - limite de ce guide : Reptile One indique de ne pas descendre sous 16 °C la nuit ; cette limite n'est pas une température cible. [S5]

Portée : captivité ; borne basse indiquée par Reptile One. Une limite rapportée n'est pas un objectif ni un seuil physiologique établi.

Repères de la première page

AMBIANCE PUBLIÉE : 26-29 °C

Repère BGSU ; chauffe à préciser séparément [S2].

Une histoire de noms à clarifier

Le catalogue de Ryan Ellis explique pourquoi Pogona brevis a été placé en synonymie : le spécimen type de henrylawsoni, un temps considéré comme perdu, avait en réalité été réenregistré [S4]. Le Reptile Database distingue aussi « rankini », nom informel ancien, d'une espèce valablement décrite [S1]. Une facture utilisant un ancien nom ne suffit donc pas à créer une nouvelle espèce. Conserver les photographies des parents et l'historique reste utile, notamment en présence d'hybridations captives signalées par la base.

Taille adulte, longévité et mode de vie

BGSU indique environ 30 cm de longueur totale et 13 cm museau-cloaque ; les deux mesures ne doivent pas être confondues [S2].

BGSU annonce 10-15 ans comme durée moyenne, sans série démographique détaillée ; cette estimation d'entretien n'est pas un record démontré [S2].

Diurne, utilise le sol et les supports de chauffe ; la fiche universitaire le rattache à une zone de transition semi-désertique [S2].

Organiser une surface active

La fiche de BGSU associe abri, bois et éclairage de chauffe ; Maritime Geckos recommande des refuges dans plusieurs zones thermiques [S2][S3]. Ces fonctions comptent davantage qu'un volume commercial présenté seul. Dessiner les déplacements entre nourriture, repos et exposition permet de vérifier que les éléments ne bloquent pas la marche. Les supports doivent rester stables et accessibles. Aucun minimum chiffré récent suffisamment étayé n'est proposé ici à partir des petites installations décrites par ces documents.

Éclairage et températures : deux questions liées

BGSU donne une ambiance de 26-29 °C, tandis que les deux guides décrivent des points chauffants avec des formulations différentes [S2][S3]. Sans méthode de mesure comparable, les réunir en une plage serait artificiel. Maritime Geckos mentionne explicitement les UVB [S3]. Leur présence doit être pensée avec des retraits hors exposition. Pour documenter le montage, relever le modèle de lampe, la distance réelle, le grillage interposé et la surface accessible à l'animal, puis contrôler les mesures.

Humidité et accès à l'eau

La plage de 20-40 % est celle d'un éleveur identifié, qui présente lui-même sa fiche comme élémentaire et issue de son expérience [S3]. Elle ne décrit pas une étude des microhabitats naturels. BGSU prévoit une coupelle peu profonde [S2]. Observer les usages de l'eau et l'état du substrat complète donc un relevé central. Une brève hausse après entretien et une zone constamment détrempée ne sont pas équivalentes ; consigner le contexte évite une correction automatique mal orientée.

Insectes, végétaux et compléments

Les deux sources pratiques décrivent une alimentation mixte, avec proies et végétaux [S2][S3]. Elles ne valident pas une proportion nutritionnelle universelle selon l'âge. Présenter les aliments de façon identifiable aide à vérifier ce qui est réellement consommé, particulièrement chez un jeune qui sélectionne les insectes. Retirer les proies non mangées fait partie des précautions mentionnées par BGSU [S2]. Le programme de calcium et de vitamines doit tenir compte de l'ensemble du menu et de l'éclairage, sans multiplier aveuglément les produits.

Précisions & sources

Pogona henrylawsoni

Cohabitation : des recommandations contradictoires

BGSU évoque des groupes comprenant plusieurs mâles, tandis que Maritime Geckos recommande l'entretien individuel hors reproduction [S2][S3]. Cette divergence ne permet pas de déclarer la cohabitation sans risque. Un projet individuel évite d'avoir à interpréter les interactions d'un groupe dès l'arrivée. Dans tout élevage collectif déjà établi, suivre séparément l'accès aux repas, aux abris et à l'exposition est plus précis que noter seulement que les animaux restent proches ou paraissent calmes.

Pontes et jeunes : des données attribuées

BGSU rapporte des pontes de 5-18 œufs et une incubation à 28 °C dans sa synthèse d'élevage [S2]. Le document ne fournit pas les résultats détaillés nécessaires pour en faire une recette complète. Son calendrier de refroidissement n'est pas reproduit comme une étape obligatoire. Préparer une zone de ponte et des installations pour les jeunes suppose d'abord de confirmer l'identité des reproducteurs, leur maturité et leur état. Les différences de croissance doivent rester observables individuellement.

Ce que le suivi permet de vérifier

Une petite espèce ne devient pas automatiquement facile à maintenir dans un petit volume. Les sources consultées apportent surtout une taxonomie solide et des pratiques d'élevage, avec moins de données expérimentales sur le climat captif [S1][S2][S3][S4]. Photographier l'installation et garder les mesures permet à un intervenant de comprendre un changement d'appétit ou d'activité. L'âge inconnu ne se calcule pas à partir d'une longueur. Une faiblesse ou une perte de masse persistante justifie un examen, sans attendre une prétendue échéance de mue.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver l'identité et la provenance de l'animal.

[ ] Préparer des zones exposées et des refuges mesurables.

[ ] Suivre individuellement repas, masse et comportement.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Pogona henrylawsoni
https://reptile-database.reptarium.cz/Pogona/henrylawsoni
Consulté le 2026-10-26

[S2] BGSU Herpetarium - Rankin's Dragon
https://www.bgsu.edu/arts-and-sciences/biological-sciences/facilities-and-resources/bgsu-herpetarium/animals/reptiles/rankins-dragon.html
Consulté le 2026-10-26

[S3] Maritime Geckos - Rankin's Dragon care sheet
https://www.maritimegeckos.ca/uploads/1/3/5/1/13510871/care_sheet_rankins_dragon.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] Ellis (2019) - An annotated type catalogue of the dragon lizards in the Western Australian Museum
https://museum.wa.gov.au/sites/default/files/WAMRecords_2019_34%282%29_115to132_ELLIS.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S5] Black Soil Bearded Dragon - Pogona henrylawsoni
https://reptileone.com.au/care-sheets/Black-Soil-Bearded-dragon.pdf
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : No machine-readable author provided. Magalhães assumed (based on copyright claims). · Public domain
Pogona henrylawsoni.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Suivi du poids d'un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/pogona-henrylawsoni/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.