COMPRENDRE CETTE VARIÉTÉ

Milkback Isopode

Porcellio laevis « Milkback »

« Milkback » est une appellation commerciale rattachée à Porcellio laevis par le vendeur. Elle ne représente pas une espèce scientifique supplémentaire. [S1]

Cloporte terrestre | Variété commerciale

TAILLE ANNONCÉE

15-20 mm

Valeur commerciale, mesure non détaillée. [S1]

LONGÉVITÉ

À documenter

Pas de durée individuelle validée retenue.

IDENTIFICATION

Variété

Variété commerciale. [S1]

01 Substrat et abris

Litière et refuges

Protocole commercial détaillé dans la fiche. [S1]

02 Température & lumière

REPÈRE COMMERCIAL **18-26 °C [S1]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuilles et bois décomposés ; détails du protocole et des compléments dans la fiche. [S1]

04 L’humidité varie

Refuge humide

Suivre le substrat et le renouvellement d’air. [S1]

À NOTER DANS VOTRE CARNET

Apports et restes · Substrat · Mesures datées · Jeunes observés · Transferts

Précisions & sources

Porcellio laevis - Milkback

Comprendre cette fiche

Porcellio laevis « Milkback » : identité, indications commerciales de maintien, suivi de colonie et limites des connaissances.

« Milkback » est une appellation commerciale rattachée à Porcellio laevis par le vendeur. Elle ne représente pas une espèce scientifique supplémentaire. [S1]

Origine

Origine exacte de la souche non documentée ici. Un nom de variété ou une localité commerciale ne suffit pas à établir une provenance de collecte.

Mode de vie

Le mélange décrit par le vendeur associe terre sans engrais, feuilles en décomposition et bois décomposé ; des abris complètent l'installation. [S1]

Taille adulte

La fiche commerciale annonce 15-20 mm à l'âge adulte, sans protocole de mesure détaillé. [S1]

Longévité

Durée de vie individuelle non établie dans les sources retenues.

Habitat complet

Le mélange décrit par le vendeur associe terre sans engrais, feuilles en décomposition et bois décomposé ; des abris complètent l'installation. [S1] Aucun volume minimum validé n'est établi ici.

Paramètres et méthode de mesure

Humidité du substrat : Le vendeur préconise un gradient avec refuge humide et secteur moins humide, à contrôler dans le substrat. [S1]

Ventilation : Le vendeur conseille de renouveler l'air tout en conservant un refuge humide. [S1]

Repères de la première page

REPÈRE COMMERCIAL : 18-26 °C

Isopodshop ; pas un seuil de sécurité. [S1]

Identifier la référence et conserver sa provenance

« Milkback » est une appellation commerciale rattachée à Porcellio laevis par le vendeur. Elle ne représente pas une espèce scientifique supplémentaire. [S1]

Conserver le nom reçu, le vendeur et la date d'acquisition. La vérification d'un nom taxonomique ne vaut pas identification du lot acheté.

Substrat, abris et nourriture

Le mélange décrit par le vendeur associe terre sans engrais, feuilles en décomposition et bois décomposé ; des abris complètent l'installation. [S1]

Le vendeur utilise feuilles décomposées et bois dégradé comme ressources de fond ; les compléments sont apportés en petites quantités selon les restes observés. [S1]

Une source calcaire, notamment de l'os de seiche, est mentionnée dans le protocole du vendeur. [S1]

Mesures et différences entre vendeurs

Isopodshop propose 18-26 °C pour le maintien. C'est un repère commercial, pas une plage de sécurité démontrée. [S1]

Insectorus indique 18-26°C. Cette plage commerciale ne démontre pas des seuils de sécurité. [S3]

Insectorus annonce 1.5cm à l'âge adulte, sans méthode de mesure explicitée. [S3]

Comparer les chiffres avec leur source et leur contexte. Une union de plages commerciales n'est ni un optimum ni une limite de sécurité démontrée.

Reproduction et longévité : les limites documentaires

Aucun âge de maturité, nombre de jeunes par portée, calendrier reproductif ou durée de vie individuelle suffisamment étayé n'est retenu pour cette référence. La longévité d'une colonie ne mesure pas celle d'un individu.

Dans le carnet, dater les jeunes réellement observés et distinguer comptage, estimation et absence d'observation. Aucun rendement de reproduction n'est promis.

Suivre la colonie au quotidien

Noter les apports, les restes, les zones de substrat observées et les mesures avec leur emplacement. Conserver les photos de sa propre souche et les changements d'installation.

Pour une division de colonie, enregistrer la date et le nombre réellement transféré, s'il est connu. Ne pas transformer une simple observation en naissance comptabilisée.

Références françaises : Porcellio laevis « Milkback »

Présence en catalogue vérifiée : Isopodshop [S1] ; Insectorus [S3]. Il ne s'agit pas d'un classement national des ventes.

Les pratiques ci-dessus proviennent de fiches commerciales. Les sources purement taxonomiques ou attestant seulement la vente ne justifient pas de conseils de maintien.

Précisions & sources

Porcellio laevis - Milkback

Checklist avant l’arrivée

[ ] Conserver le nom exact et l’origine du lot.

[ ] Consulter les limites et les sources de cette fiche.

[ ] Vérifier les fermetures du bac et noter les mesures de départ.

Sources consultées

[S1] Porcellio laevis « Milkback » - Isopodshop
https://isopodshop.fr/products/porcellio-laevis-milkback
Consulté le 2026-10-29

[S2] World Marine, Freshwater and Terrestrial Isopod Crustaceans database - Porcellio laevis
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=262343
Consulté le 2026-10-29

[S3] Porcellio laevis Milkback - Insectorus
https://insectorus.fr/products/porcellio-laevis-milk-back
Consulté le 2026-10-29

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/porcellio-laevis-milkback/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.