

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python à queue courte de Bornéo

Python breitensteini

Bornéo, notamment Kalimantan, Sabah et Sarawak. [S1] Activité surtout crépusculaire selon Dudley Zoo ; chasseur d'affût dans le retour VPI. [S2][S3]

Bornéo · Python à queue courte

TAILLE ADULTE

1,5-1,8 m

Dudley Zoo ; TL/SVL non précisé [S2].

LONGÉVITÉ

20-30 ans

Repère pédagogique captif [S2].

MODE DE VIE

Crépusculaire

Activité à l'aube et au crépuscule [S2].

01 Un habitat adapté

Sol et refuges

Sécurité et ventilation [S3].

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**30-31 °C [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**26-28 °C d'ambiance [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs adaptés ; surveiller les portions [S3][S5].

04 L'humidité varie

Environ 60 %

Repère d'élevage groupé [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Historique manuel des rations. · Poids et silhouette dans des conditions comparables. · Mues, état du substrat et usage des refuges.

Précisions & sources

Python à queue courte de Bornéo

Comprendre cette fiche

Python breitensteini : origine à Bornéo, mesures de longueur, refuges, climat captif et suivi alimentaire d'un python massif à courte queue.

Ce python de Bornéo appartient au groupe des espèces à queue courte, mais possède une identité propre. Les comparaisons de taille et les recommandations communes au groupe doivent rester distinctes des observations faites sur cette espèce. [S1][S2]

Origine

Bornéo, notamment Kalimantan, Sabah et Sarawak. [S1]

Habitat complet

Espace sécurisé, ventilé et accessible pour un animal large ; dimensions à adapter au gabarit réel. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Ambiance : Environ 26-28 °C

Conversion arrondie de 78-82 °F dans le cadre de pratique VPI. [S3]

Zone localement chauffée : Environ 30-31 °C

86-88 °F dans le même cadre ; mesurer la surface accessible. [S3]

Humidité : Environ 60 %, repère de groupe

Retour d'élevage The Blood Cell pour les pythons à queue courte, pas une étude de terrain. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 30-31 °C

Conversion VPI, 86-88 °F [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 26-28 °C d'ambiance

Conversion VPI, 78-82 °F [S3].

Une espèce de Bornéo, pas un morphe de curtus

Le Reptile Database traite Python breitensteini comme espèce et répertorie Python curtus breitensteini parmi les anciennes combinaisons. [S1] Les fiches historiques parlant seulement de « blood python » doivent donc être lues avec attention. Conserver le nom scientifique, les documents de cession et la provenance déclarée permet de savoir quelle information appliquer. Une livrée pâle sélectionnée en élevage n'est pas un quatrième taxon. La couleur photographiée dépend aussi de l'éclairage ; elle ne suffit pas à certifier l'identité.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Dudley Zoo indique 1,5-1,8 m sans convention de mesure ; VPI publie des longueurs totales variables selon le sexe. [S2][S3]

20-30 ans en captivité dans la fiche pédagogique de Dudley Zoo ; ce n'est pas une moyenne de cohorte. [S2]

Activité surtout crépusculaire selon Dudley Zoo ; chasseur d'affût dans le retour VPI. [S2][S3]

Taille : éviter les chiffres incompatibles

Dudley Zoo affiche 1,5-1,8 m sans expliciter longueur totale ou museau-cloaque. [S2] Les Barker précisent, eux, des longueurs totales et des différences selon le sexe dans leur fiche VPI. [S3] Ces données ne proviennent pas du même échantillon et ne sont pas fusionnées en une fausse moyenne. Mesurer régulièrement l'individu avec une méthode non contraignante et conservée dans le carnet est plus informatif qu'une comparaison à un maximum annoncé. Le logement doit également tenir compte de la largeur du corps et des possibilités de retournement.

Des habitats humides avec des abris

Dudley Zoo situe l'espèce dans les forêts humides de Bornéo, notamment près des marais et des cours d'eau. Il décrit une activité surtout à l'aube et au crépuscule. [S2] Ce tableau ne signifie pas que tout le sol captif doit être saturé. Organiser les passages, le couvert et des zones inspectables permet de suivre un serpent discret sans le sortir systématiquement. L'observation peut se faire à des horaires comparables ; un animal immobile à midi ne résume pas son comportement sur vingt-quatre heures.

Construire un habitat accessible

VPI insiste sur la sécurité et la ventilation du logement. [S3] En pratique, prévoir des accès permettant de retirer l'eau et les souillures sans soulever inutilement l'animal. Les éléments lourds doivent rester stables et les passages de portes suffisamment dégagés. Le matériel de pesée ou de transport doit être choisi avant d'en avoir besoin. Ne pas transformer les anciens contenants décrits par des éleveurs en minimum de bien-être : une dimension publiée sans étude ne démontre pas qu'un animal plus grand disposera d'un espace suffisant.

Climat : garder un cadre cohérent

Les Barker décrivent une ambiance de 78-82 °F, environ 26-28 °C, et une petite zone chauffée à 86-88 °F, environ 30-31 °C. [S3] La couverture conserve ce cadre de pratique sans ajouter d'extrême emprunté à une autre espèce. The Blood Cell rapporte environ 60 % d'humidité pour le groupe, avec une attention au renouvellement de l'air. [S4] Relever les valeurs au niveau du serpent et distinguer air, surface et refuge permet de vérifier l'installation ; le thermostat seul ne constitue pas un relevé complet.

Alimentation : documenter les portions

VPI décrit l'acceptation de rongeurs et le risque de suralimentation chez ce python à affût. [S3] The Blood Cell souligne également l'intérêt d'adapter les repas à l'état corporel des espèces à queue courte. [S5] Tenir un historique individuel évite d'appliquer une fréquence en fonction de la seule longueur. Noter la date, le type de proie, l'acceptation et les pesées comparables. Un serpent naturellement épais peut nécessiter une évaluation précise de sa silhouette ; aucune masse adulte cible universelle n'est déduite des grands spécimens publiés.

Précisions & sources

Python à queue courte de Bornéo

Reproduction et traçabilité des jeunes

L’espèce est ovipare selon le Reptile Database. [S1] Le manuel CITES regroupe plusieurs paramètres des pythons à queue courte et demande des preuves lorsqu’une origine captive est déclarée. [S6] Nous ne convertissons pas ces tableaux groupés en nombre d’œufs attendu pour chaque femelle. Pour une reproduction préparée, attribuer des identifiants aux parents et aux pontes, conserver les dates et prévoir le suivi séparé des premiers repas. Une mention « né en captivité » mérite un historique cohérent, pas seulement une affirmation commerciale.

Suivi quotidien et limites utiles

Dudley Zoo rappelle la pression des prélèvements et de la perte d’habitat. [S2] Dans le projet d’accueil, cette information renforce l’intérêt des documents de provenance. Au quotidien, consigner eau, substrat, mue, repas et comportement permet d’expliquer une évolution au vétérinaire. Une immersion répétée ou une modification de respiration ne doit pas être interprétée automatiquement comme une simple préférence. Préparer les observations, les photographies et les paramètres réels. La longévité pédagogique est un horizon de responsabilité, sans promesse de durée pour l’animal acquis.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier identité et origine captive documentée.

[ ] Prévoir des accès adaptés à un corps massif.

[ ] Conserver un cadre thermique unique et mesuré.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Python breitensteini
https://reptile-database.reptarium.cz/Python/breitensteini
Consulté le 2026-10-26

[S2] Dudley Zoo and Castle - Borneo Short-Tailed Python
https://www.dudleyzoo.org.uk/animal/borneo-short-tailed-python/
Consulté le 2026-10-26

[S3] David et Tracy Barker, VPI - Borneo Pythons, archive consultée
https://vpi-archive-3k6.pages.dev/publications/borneo_pythons_information_and_care_sheet
Consulté le 2026-10-26

[S4] The Blood Cell - Humidity, expérience d’élevage
https://www.bloodpythons.com/index.php/blood-stp-info/husbandry/captive-environment/humidity
Consulté le 2026-10-26

[S5] The Blood Cell - Feeding, expérience d’élevage
https://www.bloodpythons.com/index.php/blood-stp-info/husbandry/feeding
Consulté le 2026-10-26

[S6] CITES / TRAFFIC - Inspection Manual, 2013, pages 46-47
https://cites.unia.es/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Python1.jpg : Sujit kumar derivative work: Tigerpython (talk) · CC BY-SA 3.0
Head-Python breitensteini2.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

À quelle fréquence nourrir un serpent ? Construire un suivi adapté

Décongeler une proie pour serpent : méthode et hygiène

Trouver un vétérinaire pour son reptile et préparer la consultation

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/python-breitensteini/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.