

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python sanguin

Python brongersmai

Asie du Sud-Est, notamment Sumatra et péninsule Malaise ; la répartition ne doit pas être confondue avec celle du python de Bornéo. [S1] Python à corps massif ; observation et interventions adaptées à l'individu. [S2][S5]

Python à queue courte | Terrestre

TAILLE ADULTE

132-144 cm SVL

Moyennes d'un échantillon, queue exclue [S2].

LONGÉVITÉ

Non établie

Pas de moyenne retenue.

MODE DE VIE

Corps robuste

Groupe à queue courte [S1].

01 Un habitat adapté

Refuges au sol

Parcours et accès adaptés au gabarit.

02 Température & lumière

POINT CHAUD · JOUR	**30 °C selon besoin [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**27-29 °C d'ambiance [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs adaptés ; suivre la condition corporelle [S5].

04 L'humidité varie

Environ 60 %

Repère d'éleveur pour le groupe [S4].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Carnet manuel des proies et refus. · Poids, silhouette et mues datés. · Mesures thermiques et humidité localisées.

Précisions & sources

Python sanguin

Comprendre cette fiche

Python brongersmai : distinguer le python sanguin, comprendre son gabarit, mesurer chaleur et humidité et organiser les repas sans suralimenter.

Le python sanguin est une espèce distincte des autres pythons à queue courte. Son corps robuste rend particulièrement utile un suivi des repas et de l'état corporel, au-delà de sa réputation d'animal au bon appétit. [S1][S5]

Origine

Asie du Sud-Est, notamment Sumatra et péninsule Malaise ; la répartition ne doit pas être confondue avec celle du python de Bornéo. [S1]

Habitat complet

Prévoir une surface au sol utilisable, des refuges et un accès de maintenance compatible avec le gabarit adulte.

Paramètres et méthode de mesure

Ambiance diurne : Environ 27-29 °C

Conversion arrondie des 80-84 °F utilisés par The Blood Cell pour les trois espèces. [S3]

Chauffe supplémentaire : 30 °C dans certains cas

86 °F proposés à certains adultes dans l'élevage, pas un réglage obligatoire pour tous. [S3]

Humidité : Environ 60 %, cadre d'éleveur

Valeur moyenne de pratique, avec contrôle de la ventilation ; pas de sol constamment détrempé. [S4]

Repères de la première page

POINT CHAUD · JOUR : 30 °C selon besoin

Chauffe de certains adultes chez TBC [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : 27-29 °C d'ambiance

Conversion de 80-84 °F [S3].

Identifier l'espèce avant la couleur

Python brongersmai est accepté par le Reptile Database, qui conserve Python curtus brongersmai comme ancienne combinaison. [S1] L'étude de Keogh, Barker et Shine distingue les trois taxons historiquement réunis sous Python curtus. [S2] Une couleur rouge ou un nom de morphe ne remplace pas cette identification. Garder séparément espèce, sélection de couleur et provenance déclarée évite les doublons. Lors d'un achat, demander le nom des parents et les documents disponibles, sans transformer une appellation commerciale en preuve de localité.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Échantillon sauvage cité par Keogh et collègues : moyennes de 132,4 cm SVL chez les mâles et 143,9 cm chez les femelles ; queue exclue. [S2]

Aucune moyenne de longévité spécifique suffisamment documentée retenue.

Python à corps massif ; observation et interventions adaptées à l'individu. [S2][S5]

Lire correctement le gabarit

L'étude taxonomique rapporte, pour un échantillon sauvage étudié antérieurement, des moyennes de 132,4 cm chez les mâles et 143,9 cm chez les femelles en longueur museau-cloaque. [S2] La queue est donc exclue ; ces valeurs ne peuvent pas être comparées directement à des annonces en longueur totale. Le gabarit massif ne fournit pas non plus un poids cible universel. Pour préparer le logement, relever les dimensions de l'individu et prévoir des ouvertures permettant de le déplacer sans coincer son corps contre le cadre.

Installer un environnement inspectable

Avant l'arrivée, vérifier les fermetures et la stabilité des refuges avec une procédure écrite. Un accès facile à l'eau et au substrat réduit les déplacements imposés au serpent lors de l'entretien. La synthèse CITES souligne l'importance des registres et de la vérification des installations lorsqu'une naissance captive est déclarée. [S6] Pour un particulier, conserver l'historique alimentaire et de provenance dès le départ constitue un prolongement pratique de cette traçabilité. Une installation propre au moment de la cession ne démontre pas à elle seule l'origine de l'animal.

Chauffage : ne pas confondre tropiques et surchauffe

The Blood Cell décrit pour les trois espèces un fonctionnement à 80-84 °F, soit environ 27-29 °C ; certains adultes disposent d'une zone à 86 °F, soit 30 °C. [S3] Ce retour d'élevage ne prouve pas une température optimale universelle. Le documenter comme tel évite de pousser la chaleur uniquement parce que le serpent vient des tropiques. Mesurer chaque zone accessible, dater les réglages et conserver l'emplacement des sondes permet d'interpréter les changements d'activité sans modifier plusieurs variables à la fois.

Humidité et entretien du substrat

The Blood Cell indique environ 60 % d'humidité moyenne dans son élevage et distingue clairement humidité de l'air et cage constamment mouillée. [S4] La valeur doit être accompagnée du contexte de mesure. Après un apport d'eau, noter quand les surfaces redeviennent sèches et si de la condensation persiste. Un récipient renversé n'est pas une méthode de régulation. Vérifier les zones sous les refuges, où l'aspect du substrat peut différer de celui visible à l'avant, et consigner tout changement avant de conclure que l'ensemble du logement est trop sec.

Précisions & sources

Python sanguin

Alimentation et silhouette

The Blood Cell utilise des rats, adapte les repas à l’âge et à l’état corporel, et avertit contre les portions excessives chez ces serpents robustes. [S5] Cette expérience est utile pour construire un suivi, sans recopier automatiquement le calendrier d’une autre collection. Noter la proie réellement avalée, sa présentation et la date, puis comparer les pesées dans des conditions semblables. Un appétit marqué ne suffit pas à justifier une ration supplémentaire. Demander conseil en cas de refus accompagné d’une dégradation de l’état général.

Ponte et projet reproductif

L’espèce est ovipare. [S1] Les Barker décrivent des femelles enroulées autour de leurs œufs dans leur article spécialisé. [S7] Le manuel CITES regroupe certaines statistiques des trois espèces à queue courte : nous ne les présentons pas comme une portée attendue de brongersmai. [S6] Un projet exige des registres séparés pour les parents, la ponte et les jeunes. Ni une durée moyenne publiée ni une saison étrangère ne donne à elle seule une recette d’incubation ou de refroidissement à appliquer.

Précautions et suivi des changements

Les auteurs spécialisés décrivent une réponse alimentaire parfois intense. [S5] Organiser les outils et les ouvertures avant d’intervenir évite de confondre entretien et distribution de proie. Le carnet peut suivre mues, repas, défécations, posture et mesures de l’installation. Ne pas déduire une constipation du seul intervalle entre deux selles : décrire les signes observés et l’historique au vétérinaire. La fréquence des pesées doit permettre une comparaison utile sans multiplier les manipulations ; le suivi sert à comprendre l’individu, pas à atteindre un record de croissance.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Confirmer l’espèce et la provenance.

[ ] Distinguer longueur totale et longueur museau-cloaque.

[ ] Vérifier la ventilation avant d’augmenter l’humidité.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Python brongersmai
https://reptile-database.reptarium.cz/Python/brongersmai
Consulté le 2026-10-26

[S2] Keogh, Barker et Shine, 2001 - Systematics and biogeography of the Python curtus group
https://www.kingsnake.com/aho/pdf/menu2/keogh2001.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] The Blood Cell - Heating, expérience d’élevage
https://www.bloodpythons.com/index.php/blood-stp-info/husbandry/captive-environment/heating
Consulté le 2026-10-26

[S4] The Blood Cell - Humidity, expérience d’élevage
https://www.bloodpythons.com/index.php/blood-stp-info/husbandry/captive-environment/humidity
Consulté le 2026-10-26

[S5] The Blood Cell - Feeding, expérience d’élevage
https://www.bloodpythons.com/index.php/blood-stp-info/husbandry/feeding
Consulté le 2026-10-26

[S6] CITES / TRAFFIC - Inspection Manual, 2013, pages 46-47
https://cites.unia.es/file.php/1/files/cb-captive-breeding-manual-en.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S7] Dave et Tracy Barker - The Blood Python, Reptiles Magazine, 2011
https://reptilesmagazine.com/the-blood-python/
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Rushenb · CC BY-SA 4.0
Python brongersmai, Brongersma's short-tailed python.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

À quelle fréquence nourrir un serpent ? Construire un suivi adapté

Suivi du poids d’un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Décongeler une proie pour serpent : méthode et hygiène

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/python-brongersmai/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.