

COMPRENDRE SON ESPÈCE

Python de Children

Antaresia childreni

Australie, notamment Territoire du Nord, Queensland et Australie-Occidentale. [S1]
Partiellement arboricole. [S1]

Petit python | Refuges

TAILLE ADULTE
≈ 1 m
Ordre de grandeur universitaire. [S3]

LONGÉVITÉ
25,7 ans
Maximum enregistré en captivité. [S4]

MODE DE VIE
Sol et branches
Partiellement arboricole. [S1]

01 Abris et branches

Espace à dimensionner

Dimensions à adapter ; abris et branches. [S2]

02 Température & lumière

JEUNE < 1 AN · GRADIENT	**25-34 °C [S2]**
ADULTE · POINT DE CHAUFFE	**33-38 °C [S2]**
NUIT · AIR DU CÔTÉ CHAUD	**≥ 20 °C durablement [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Rongeurs décongelés ; rythme différent chez jeunes et adultes, détaillé dans la fiche. [S2]

04 L’humidité varie

50-70 %

Repère vétérinaire commun aux espèces Antaresia explicitement listées [S5].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER
Repas · Poids · Mues · Températures

Précisions & sources

Python de Children

Comprendre cette fiche

Un petit python australien dont les cachettes, le poids et les déplacements méritent autant de soin que le chauffage.

Antaresia childreni inclut désormais l'ancien Antaresia stimsoni dans la classification suivie par Reptile Database. [S1]

Origine

Australie, notamment Territoire du Nord, Queensland et Australie-Occidentale. [S1]

Mode de vie

Partiellement arboricole. [S1]

Taille adulte

Environ 1 m selon Animal Diversity Web. [S3]

Longévité

AnAge documente un maximum de 25,7 ans en captivité ; ce record ne décrit pas une moyenne. [S4]

Habitat complet

Vivarium individuel ventilé, abris et branches ; dimensions à adapter au gabarit. [S2]

Poids adulte : lire le contexte

AnAge rapporte 384 g comme masse adulte de référence, sans plage par sexe ou population. Ce point documentaire n'est ni une moyenne de tous les adultes ni un objectif de nourrissage. [S4]

Niveau d'expérience : Débutant accompagné

Appréciation éditoriale SquamaTracker, fondée sur les exigences documentées ; ce n'est pas une classification scientifique.

Distinguer jeune et adulte, sécuriser le logement et suivre les repas demande un accompagnement. Niveau éditorial. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Jeune de moins d'un an : 25-34 °C, gradient du jeune < 1 an. [S2]

La fiche préconise un chauffage continu à ce stade ; il ne s'agit pas d'une température uniforme.

Adulte : zone de chauffe : 33-38 °C. [S2]

Repère du document Antaresia, qui distingue ce point de la zone fraîche.

Adulte : zone fraîche : 16-20 °C. [S2]

Ne pas appliquer ce cadre adulte à un nouveau-né.

Nuit : air du côté chaud : Ne pas rester durablement sous 20 °C. [S2]

La zone fraîche adulte à 16-20 °C ne désigne pas la température de tout le vivarium la nuit ; conserver le gradient et le cadre spécifique du jeune.

Humidité : 50-70 % dans le tableau vétérinaire archivé. [S5]

Valeur du groupe Antaresia ; source relue le 9 octobre, non présentée comme une nouvelle mesure.

Repères de la première page

JEUNE < 1 AN · GRADIENT : 25-34 °C

Cadre clinique du jeune, chauffage continu. [S2]

ADULTE · POINT DE CHAUFFE : 33-38 °C

Côté frais adulte : 16-20 °C dans ce protocole. [S2]

NUIT · AIR DU CÔTÉ CHAUD : ≥ 20 °C durablement

Éviter une baisse prolongée sous 20 °C du côté chaud ; maintenir le gradient propre au stade. [S2]

Identité et habitat

La Reptile Database traite Antaresia stimsoni comme synonyme d'Antaresia childreni. Conserver cet ancien nom sur les documents de provenance évite de confondre changement de nom et changement d'animal. [S1]

Logement individuel ventilé, abris et branches stables ; aucun adhésif accessible. La clinique ne fixe pas de volume universel. [S2]

Chaleur et lumière

La clinique distingue jeunes et adultes ; ne pas recombiner leurs gradients. La nuit, l'air du côté chaud ne doit pas rester durablement sous 20 °C : la zone fraîche adulte à 16-20 °C ne s'applique donc pas à tout le vivarium. Le jeune de moins d'un an conserve son gradient de 25-34 °C avec chauffage continu. Elle propose 12 heures de lumière l'été, 10 l'hiver. [S2]

Leur fiche ne fournit pas de cible UVI spécifique utilisable. La température de l'air et celle du point chauffé doivent rester identifiées dans les relevés. Une donnée UVB manquante n'est pas une démonstration d'absence de bénéfice : faire préciser le dispositif avant installation.

Substrat et eau

Papier possible pour l'observation ; prévenir l'ingestion du substrat. Une eau propre reste accessible dans un récipient stable. [S2]

Noter le matériau utilisé, la date de changement et l'apparition éventuelle de souillures facilite la comparaison après un réaménagement. Le but est de comprendre ce qui a changé, sans attribuer automatiquement un refus alimentaire à la dernière intervention.

Alimentation selon le stade

Souris ou rats adaptés, entièrement décongelés : jeunes tous les 7-10 jours, adultes toutes les 1-3 semaines selon condition. Cadre Antaresia incluant childreni. [S2]

Animal Diversity Web décrit chez childreni un régime sauvage comprenant notamment petits mammifères, amphibiens et lézards. Cet inventaire ne remplace pas un plan de nourrissage en captivité et ne recommande aucune collecte de proies sauvages. [S3]

Précisions & sources

Python de Children

Reproduction : ponte et couvaison

L’espèce pond des œufs. [S1] La synthèse universitaire décrit, à l’échelle des Antaresia, une femelle qui couve puis des jeunes autonomes ; la reproduction mobilise les réserves corporelles maternelles. [S3]

AnAge répertorie une incubation de 55 jours, sans décrire les réglages associés : ce nombre n’est pas utilisé comme recette. [S4] Prévoir un protocole complet et un suivi professionnel avant toute tentative de reproduction.

Santé et suivi

Prévenir surchauffe et erreurs de stade. [S2] Perte de poids, blessure ou respiration inhabituelle sont des observations à communiquer au vétérinaire.

Consigner la masse avec sa date, le stade, les repas acceptés, les mues et les zones fréquentées. Le maximum de longévité d’AnAge et sa masse de référence ne décrivent pas une trajectoire obligatoire : suivre l’animal réel, pas une courbe inventée à partir de ces deux chiffres. [S4]

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier les fermetures et les supports.

[ ] Repérer chaque zone de mesure.

[ ] Conserver les données de provenance.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Antaresia childreni
https://reptile-database.reptarium.cz/Antaresia/childreni
Consulté le 2026-10-20

[S2] The Unusual Pet Vets - Antaresia Species Caresheet
https://www.unusualpetvets.com.au/wp-content/uploads/2018/05/Antaresia-Stimsons-Childrens-Spotted-and-Pygmy-Python-Care-Sheet.pdf
Consulté le 2026-10-20

[S3] University of Michigan, Animal Diversity Web - Antaresia
https://animaldiversity.org/accounts/Antaresia/
Consulté le 2026-10-20

[S4] AnAge - Antaresia childreni
https://genomics.senescence.info/species/entry.php?species=Antaresia_childreni
Consulté le 2026-10-20

[S5] Doneley et al. - Reptile Medicine and Surgery in Clinical Practice, tableau 1.5, p. 7-8
https://www.umces.edu/wp-content/uploads/drupal-files/Doneley%20et%20al%202017%20-%20Book%20--%20Reptile%20Medicine%20and%20Surgery%20in%20Clinical%20Practice.pdf
Consulté le 2026-10-09

Photographie et licence

Photo : Matt from Melbourne, Australia · CC BY 2.0
Childrens Python (Antaresia childreni) (8692421368).jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/python-de-children/

Synthèse documentaire du 2026-10-20. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.