COMPRENDRE SON ESPÈCE

Rainette aux yeux rouges

Agalychnis callidryas



Amérique centrale et nord-ouest de la Colombie. [S1] Arboricole et nocturne, elle se repose dans le feuillage le jour. [S2][S3]

Arboricole · Nocturne

TAILLE ADULTE

≈ 5-7,5 cm

Femelles généralement plus grandes. [S2]

LONGÉVITÉ

5-10 ans et plus

Estimation de captivité Tree of Life. [S3]

MODE DE VIE

Arboricole nocturne

Repos dans le feuillage pendant le jour. [S2][S3]

01 Un terrarium en hauteur

≈ 46 × 46 × 61 cm

Minimum clinique pour un individu : largeur × profondeur × hauteur ; végétation, drainage et ventilation. [S3]

02 Température & lumière

AIR AMBIANT · JOUR	≈ 24-28 °C [S2]
NUIT	≥ 22 °C [S2]

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Grillons, blattes et autres invertébrés adaptés ; surveiller la quantité consommée pour éviter la suralimentation. [S2]

04 L’humidité varie

70-90 %

Repère Tree of Life, avec ventilation et drainage. [S3]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Humidité · Températures · Activité nocturne

Précisions & sources

Rainette aux yeux rouges

Comprendre cette fiche

Rainette aux yeux rouges : terrarium vertical, humidité, températures et alimentation d'Agalychnis callidryas, avec sources.

Agalychnis callidryas est la rainette néotropicale aux yeux rouges. Elle ne doit pas être confondue avec les rainettes australiennes portant un nom commun similaire. [S1]

Origine

Amérique centrale et nord-ouest de la Colombie. [S1]

Mode de vie

Arboricole et nocturne, elle se repose dans le feuillage le jour. [S2][S3]

Taille adulte

Environ 5-7,5 cm de longueur du corps ; les femelles sont généralement plus grandes. [S2]

Longévité

5-10 ans ou davantage en captivité selon Tree of Life ; la durée varie avec les conditions et les individus. [S3]

Habitat complet

Tree of Life propose au minimum environ 46 × 46 × 61 cm pour un individu, avec branches, couvert végétal, drainage et ventilation. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Air ambiant de jour : ≈ 24-28 °C. [S2]

Conversion de 76-82 °F ; ce n'est pas une température de surface sous lampe.

Nuit : Minimum ≈ 22 °C dans la fiche Chicago Exotics. [S2]

Chauffage régulé et contrôle indépendant.

Humidité : 70-90 % selon Tree of Life. [S3]

Ventiler ; le sol ne doit pas devenir une eau stagnante.

Repères de la première page

AIR AMBIANT · JOUR : ≈ 24-28 °C

Repère Chicago Exotics, pas une température de surface. [S2]

NUIT : ≥ 22 °C

Minimum indiqué dans cette fiche clinique. [S2]

Alimentation

Insectivore, elle reçoit notamment grillons, blattes et autres invertébrés adaptés. Chicago Exotics signale un risque de suralimentation. [S2]

Feuillage et tranquillité

Le couvert végétal offre des lieux de repos. L'eau doit être adaptée aux amphibiens et régulièrement renouvelée ; les manipulations restent occasionnelles pour protéger la peau. [S3]

Suivi utile

Observer l'occupation des perchoirs après extinction et noter les proies acceptées. Relever les températures dans plusieurs zones accessibles et l'humidité avant et après pulvérisation. Conserver les horaires de brumisation et la méthode de préparation de l'eau : un pourcentage isolé ne décrit ni la ventilation ni l'état du substrat.

Feuilles de repos et développement des jeunes

La fiche décrit le repos diurne sur la face inférieure des feuilles et les disques adhérents aux doigts. Un feuillage réellement accessible sert donc de support de repos, pas seulement de décoration. [S4]

Les œufs sont déposés sur des feuilles au-dessus de l'eau, vers laquelle les têtards tombent après l'éclosion. La ponte, l'éclosion et le développement aquatique sont des étapes distinctes à dater ; aucune durée universelle n'est calculée ici. [S4]

Compléments alimentaires : distinguer les situations

La fiche Chicago Exotics prévoit des compléments de calcium et de vitamines sur les aliments. [S2]

Portée : captivité ; protocole de Chicago Exotics pour Agalychnis callidryas. Tenir compte de la composition du régime et de l'installation ; aucun dosage universel n'est fixé par cette synthèse.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier les cachettes dans le feuillage.

[ ] Contrôler les sondes en hauteur.

[ ] Préparer une eau adaptée.

Sources consultées

[S1] AMNH - Amphibian Species of the World : Agalychnis callidryas
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Phyllomedusidae/Agalychnis/Agalychnis-callidryas
Consulté le 2026-10-09

[S2] Red Eyed Tree Frog Care (Agalychnis callidryas)
https://www.exoticpetvet.com/red-eyed-tree-frog-care.html
Consulté le 2026-10-29

[S3] Tree of Life Exotic Pet Medical Center - Red-eyed tree frog care
https://treeoflifeexotics.vet/education-resource-center/for-clients/amphibians/red-eyed-tree-frog-care
Consulté le 2026-10-09

[S4] Bebesaurus - Agalychnis callidryas
https://www.bebesaurus.com/blog/fiche-d-elevage-agalychnis-callidryas-rainette-a-yeux-rouges-n81
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : Careyjamesbalboa (Carey James Balboa) · Public domain
Red eyed tree frog edit2.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Précisions & sources

Articles complémentaires

Que mange une grenouille en captivité ? Aliments et repas

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/rainette-yeux-rouges/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.