COMPRENDRE SON ESPÈCE

Ranitoméya imitatrice

Ranitomeya imitator



Ranitomeya imitator est une espèce, avec plusieurs formes de coloration. Une variation commerciale ne constitue pas automatiquement une espèce supplémentaire. [S3]

Fiche naturaliste · Diurne

TAILLE DOCUMENTÉE

13-20 mm

13-20 mm de longueur museau-cloaque dans l'article expérimental consulté. [S4]

LONGÉVITÉ

8-12 ans

Detroit Zoo publie un repère de 8-12 ans ; ce chiffre ne prédit pas la durée de vie d'un individu. [S1]

MODE DE VIE

Végétation

Petite grenouille qui grimpe dans la végétation ; les relations entre partenaires et les territoires ont été étudiés dans la nature. [S1][S2]

01 Milieu et aménagement

Supports et refuges

Aucun minimum de terrarium ni réglage thermique n'est déduit de la surface des territoires sauvages. Une référence de captivité reste nécessaire.

02 Température & lumière

PARAMÈTRES DE CAPTIVITÉ **À documenter**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Petites proies adaptées aux adultes ; alimentation des têtards distincte. [S1][S2]

04 L'humidité varie

À documenter

Aucun pourcentage de captivité suffisamment documenté n'est retenu.

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas proposés et réellement consommés · Poids, taille et évolution corporelle · Mesures du milieu et entretien · Comportements, observations et événements datés

Précisions & sources

Ranitoméya imitatrice

Comprendre cette fiche

Une petite grenouille péruvienne connue pour ses soins parentaux et la diversité de ses couleurs.

Ranitomeya imitator est une espèce, avec plusieurs formes de coloration. Une variation commerciale ne constitue pas automatiquement une espèce supplémentaire. [S3]

Origine

Forêts du nord et du nord-est du Pérou. [S1]

Mode de vie

Petite grenouille qui grimpe dans la végétation ; les relations entre partenaires et les territoires ont été étudiés dans la nature. [S1][S2]

Taille adulte

13-20 mm de longueur museau-cloaque dans l'article expérimental consulté. [S4]

Longévité

Detroit Zoo publie un repère de 8-12 ans ; ce chiffre ne prédit pas la durée de vie d'un individu. [S1]

Habitat complet

Aucun minimum de terrarium ni réglage thermique n'est déduit de la surface des territoires sauvages. Une référence de captivité reste nécessaire.

Paramètres et méthode de mesure

Températures, humidité et UVB : À documenter

Les articles de comportement ne sont pas des fiches d'installation.

Identification des formes : Une espèce, plusieurs formes [S3]

Conserver la localité séparément du nom scientifique.

Repères de la première page

PARAMÈTRES DE CAPTIVITÉ : À documenter

Les descriptions du milieu naturel ne fixent pas les réglages du terrarium.

Soins des jeunes

L'étude de Brown, Morales et Summers documente des soins biparentaux et la distribution d'œufs nourriciers aux têtards dans de petites réserves d'eau. Ce fonctionnement ne permet pas de garantir la compatibilité de deux animaux captifs. [S2]

Alimentation et suivi

Detroit Zoo cite de petits insectes dans le régime. La taille des proies, la consommation observée et le stade doivent rester des données distinctes dans le carnet. [S1]

Éviter les doublons

La révision du genre traite les variations de coloration dans le cadre de l'espèce. Les noms de localités peuvent servir de filtres ou d'alias, pas de nouvelles fiches d'espèce sans justification taxonomique. [S3]

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier l'identité et l'origine de l'animal avant l'acquisition.

[ ] Préparer le logement et contrôler les mesures avant l'arrivée.

[ ] Conserver les coordonnées d'un vétérinaire habitué à ce groupe.

Sources consultées

[S1] Detroit Zoo - Mimic Poison Frog
https://detroitzoo.org/animal/mimic-poison-frog/
Consulté le 2026-10-29

[S2] Brown, Morales & Summers 2010 - Biparental care and monogamy
https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/650727
Consulté le 2026-10-29

[S3] Brown et al. 2011 - Revision of Ranitomeya
https://www.sdmtoolbox.org/data/PDFs/023_Brown_Twomey_etal_2011_Revision_of_Ranitomeya.pdf
Consulté le 2026-10-29

[S4] Journal of Experimental Biology 2024 - Individual vocal recognition
https://journals.biologists.com/jeb/article-pdf/227/3/jeb246753/3367095/jeb246753.pdf
Consulté le 2026-10-29

Photographie et licence

Photo : AgainErick · CC BY-SA 4.0
Ranitomeya imitator - Diergaarde Blijdorp - Rotterdam.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/ranitomeya-imitator/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.