
COMPRENDRE SON ESPÈCE

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra



Largement répartie en Europe centrale et méridionale ; le zoo de Salzbourg cite les forêts de feuillus et les forêts mixtes. [S3] Adulte terrestre utilisant les retraits forestiers ; larves aquatiques chez les formes centrales traitées par Citizen Conservation. [S1][S2]

Milieu frais | Origine documentée

TAILLE

15-20 cm

Longueur totale, repère zoologique [S3].

LONGÉVITÉ

Plusieurs décennies

Records >40 ans rapportés par EAZA [S1].

MODE DE VIE

Terrestre adulte

Larves aquatiques, selon population [S2].

01 Milieu adulte

Terrestre frais

Refuges différenciés et eau accessible [S2].

02 Température & lumière

ÉTÉ, GUIDE CC	**Autour ou sous 20 °C [S2]**
LARVES	**Milieu aquatique [S2]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Vers et insectes identifiés ; nutrition et proies restantes à suivre [S2].

04 L’humidité varie

Gradient, pas saturation

Surveiller le substrat sous les refuges [S2].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Température · Repas · Sol · Stade

Précisions & sources

Salamandre tachetée

Comprendre cette fiche

Salamandre tachetée : comprendre le milieu frais, le sol, les repas, les larves et la biosécurité, avec guides EAZA et Citizen Conservation contextualisés.

La salamandre tachetée est un amphibien terrestre des milieux boisés européens. Les guides EAZA et Citizen Conservation traitent surtout les formes d'Europe centrale et occidentale. [S1][S2] Leur portée est précisée ici : les recommandations ne sont pas automatiquement identiques pour toutes les populations du complexe.

Origine

Largement répartie en Europe centrale et méridionale ; le zoo de Salzbourg cite les forêts de feuillus et les forêts mixtes. [S3]

Habitat complet

Terrarium terrestre frais, ventilé, avec plusieurs refuges et un récipient d'eau accessible. Citizen Conservation insiste sur les gradients et sur la prévention d'un substrat uniformément détrempé. [S2]

Paramètres et méthode de mesure

Température estivale : Rester autour ou sous 20 °C dans le guide CC [S2]

Repère pour les populations centrales ; anticiper les épisodes chauds.

Microclimats : Retraits humides et zones moins humides [S2]

Un taux d'air unique ne décrit pas l'humidité du substrat.

Eau : Récipient facilement accessible à l'adulte [S2]

Les larves nécessitent une installation aquatique séparément adaptée.

Repères de la première page

ÉTÉ, GUIDE CC : Autour ou sous 20 °C

Populations centrales, recommandation attribuée [S2].

LARVES : Milieu aquatique

Installation adaptée à leur stade [S2].

Préciser la provenance biologique

Le document EAZA porte sur Salamandra salamandra terrestris et Citizen Conservation couvre principalement terrestris et salamandra. [S1][S2] Il faut conserver cette précision lorsqu'on reprend un paramètre. Une photographie noire et jaune ne révèle ni la population ni la filiation. La provenance annoncée, les documents et l'identification doivent rester associés, sans transformer une variation de dessin en nouvelle sous-espèce certaine.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Le zoo de Salzbourg présente une longueur de 15-20 cm, corps et queue compris ; les différences de population et d'individu restent importantes. [S3]

Le guide EAZA rapporte des individus captifs dépassant 40 ans, dont des observations au-delà de 50 ans. Ce sont des records publiés, pas une espérance moyenne. [S1]

Adulte terrestre utilisant les retraits forestiers ; larves aquatiques chez les formes centrales traitées par Citizen Conservation. [S1][S2]

Forêt fraîche, pas serre tropicale

L'EAZA décrit des forêts humides et des refuges qui amortissent les variations de température. [S1] Une ambiance très chaude et saturée n'est donc pas l'équivalent fonctionnel de ce milieu. Le choix de la pièce et son comportement en été sont déterminants. Tester plusieurs points du terrarium permet de vérifier qu'un retrait frais reste réellement disponible, même lorsque l'éclairage du décor fonctionne ou que la pièce est occupée.

Un sol que l'on peut entretenir

Citizen Conservation souligne que les déchets ne doivent pas s'accumuler dans le substrat et que le décor doit rester contrôlable. [S2] Prévoir l'accès sous les refuges évite d'avoir à déplacer toute l'installation pour une inspection. Un beau tapis végétal ne rend pas invisibles les besoins de nettoyage. Le volume humide et les zones moins humides doivent pouvoir être observés sans obliger l'animal à quitter chaque cachette.

Une prédatrice d'invertébrés

Le zoo cite insectes et mollusques dans son alimentation. [S3] Le guide d'élevage utilise notamment vers de terre et insectes d'élevage, avec une gestion nutritionnelle adaptée. [S2] Une ration variée se prépare à partir de proies identifiées ; elle ne consiste pas à déposer en continu des insectes dans le décor. Les proies restantes, leur taille et la consommation de chaque animal sont utiles pour juger la distribution.

Vie discrète et sécrétions cutanées

Caudata Culture rappelle les sécrétions défensives des salamandres du genre. [S4] Le projet doit privilégier l'observation dans le bac et limiter les contacts aux interventions nécessaires. Ni la main ni le visage ne doivent devenir le support d'une démonstration. Le fait qu'un animal ne bouge pas pendant une manipulation ne prouve pas qu'elle soit confortable ; prévoir un contenant de transfert adapté évite les gestes improvisés.

De l'accouplement aux larves

La reproduction décrite pour les formes centrales comprend un accouplement terrestre et le transfert d'un spermatophore, puis la libération de larves dans l'eau. [S2] Caudata Culture rappelle aussi l'existence de populations donnant naissance à des jeunes déjà métamorphosés. [S4] La stratégie reproductive doit donc être rattachée à la population. Un adulte qui approche l'eau n'indique pas à lui seul une mise bas, et l'absence d'œufs visibles n'exclut pas une reproduction.

Précisions & sources

Salamandre tachetée

Accompagner la transition terrestre

Les larves et les adultes n'utilisent pas le même espace. [S2] Préparer un dispositif de sortie au moment approprié demande d'observer la transformation, plutôt que de compter uniquement les jours depuis la naissance. Les jeunes doivent pouvoir gagner un refuge terrestre accessible sans escalader une paroi lisse. Les animaux de tailles différentes doivent rester séparables, et la disponibilité des petites proies doit être vérifiée avant le début de l'élevage.

Biosécurité et engagement durable

Le guide EAZA consacre une partie importante à Bsal, champignon pathogène des salamandres. [S1] Une nouvelle acquisition doit donc avoir son matériel et une procédure de quarantaine définie avec un professionnel ; les plantes et matériaux naturels ne sont pas automatiquement neutres. Ne pas prélever de salamandres sauvages et vérifier les obligations actuelles avant détention. Cette fiche n'explique aucun traitement ni hivernage forcé : ces procédures ne se déduisent pas d'un simple calendrier.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Prévoir les étés chauds.

[ ] Identifier la population annoncée.

[ ] Séparer nouveaux arrivants et matériel.

Sources consultées

[S1] EAZA (2021) - Fire Salamander Best Practice Guidelines
https://www.amphibianark.org/fileadmin/uploads/aark/Husbandry_Library/2021-Fire-Salamander-EAZA-Best-Practice-Guidelines-Approved.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S2] Citizen Conservation (2023) - Salamandra salamandra, Central Europe
https://citizen-conservation.org/wp-content/uploads/2024/04/CC-Breeding-Guidelines_Salamandra-salamandra-Central-Europe_02-2023.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S3] Zoo Salzburg - Feuersalamander
https://www.salzburg-zoo.at/de/tiere/tieruebersicht/feuersalamander
Consulté le 2026-10-26

[S4] Caudata Culture - Salamandra
https://www.caudata.org/cc/species/Salamandra/Salamandra_sp.shtml
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Uoaei1 · CC BY-SA 4.0
Salamandra salamandra Unterlamm 02.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Triton ou salamandre : aquarium ou terrarium selon l'espèce ?

Quelle eau utiliser pour les grenouilles et autres amphibiens ?

Quarantaine des amphibiens : préparer un accueil séparé

Hygiène des reptiles et amphibiens : gestes et prévention

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/salamandra-salamandra/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.