COMPRENDRE SON ESPÈCE

Serpent-lait

Lampropeltis triangulum



Canada, États-Unis et nord du Mexique. [S1]
Discret, utilisant de nombreux abris au sol. [S2]

Terrestre · Constricteur

TAILLE ADULTE

60-90 cm

Longueur habituelle du rapport canadien ; pas une moyenne mondiale [S2].

LONGÉVITÉ

Plus de 21 ans

Un adulte a vécu 21 années supplémentaires en zoo ; âge initial inconnu [S2].

MODE DE VIE

Sous les abris

Espèce discrète de milieux variés [S2].

01 Des abris au sol

≈ 122 × 61 × 61 cm

Repère général ReptiFiles, longueur × profondeur × hauteur, à ajuster au serpent [S3].

02 Température & lumière

SURFACE CHAUDE · JOUR	**29-32 °C [S3]**
ZONE FRAÎCHE · JOUR	**≈ 24-27 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

ReptiFiles propose des proies entières décongelées, notamment des rongeurs adaptés. [S3]

04 L’humidité varie

40-60 %

Repère général ReptiFiles avec une cachette humide [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Températures

Précisions & sources

Serpent-lait

Comprendre cette fiche

Une couleuvre nord-américaine discrète, dont le nom commun a longtemps regroupé plusieurs espèces.

Cette fiche concerne Lampropeltis triangulum. Le nom « serpent-lait » a aussi servi à désigner des taxons aujourd'hui séparés. [S1][S2]

Origine

Canada, États-Unis et nord du Mexique. [S1]

Mode de vie

Discret, utilisant de nombreux abris au sol. [S2]

Taille adulte

Habituellement 60-90 cm dans le rapport canadien ; maximum rapporté de 132 cm dans son résumé. [S2]

Longévité

Un adulte capturé a vécu encore 21 ans au zoo de Philadelphie ; son âge total était supérieur. [S2]

Habitat complet

ReptiFiles relie la longueur de l'habitat à celle du serpent et prévoit plusieurs retraites. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Surface chaude : 29-32 °C. [S3]

Repère général de la fiche milksnakes, incluant cette espèce.

Zone fraîche : Environ 24-27 °C. [S3]

Conversion arrondie des 75-80 °F de la source.

Humidité : 40-60 %. [S3]

Un refuge humide complète l'ambiance.

Nuit : Environ 21-24 °C. [S3]

Conversion arrondie des 70-75 °F.

Repères de la première page

SURFACE CHAUDE · JOUR : 29-32 °C

Surface, selon la fiche générale milksnakes [S3].

ZONE FRAÎCHE · JOUR : ≈ 24-27 °C

Conversion des 75-80 °F ; nuit vers 21-24 °C [S3].

Alimentation

ReptiFiles propose des proies entières décongelées, notamment des rongeurs adaptés. [S3]

Comportement et précautions

Les tailles et les paramètres de populations tropicales anciennement classées sous triangulum ne sont pas automatiquement ceux de cette espèce nord-américaine. [S1][S2]

Suivi utile

Noter la masse, les repas acceptés ou refusés, les mues et l'emplacement des sondes. Une mesure gagne à être accompagnée de son heure et de sa zone. Comparer les observations dans la durée ; un changement inhabituel mérite un avis vétérinaire.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier les fermetures et les supports.

[ ] Repérer chaque zone de mesure.

[ ] Conserver les données de provenance.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Lampropeltis triangulum
https://reptile-database.reptarium.cz/Lampropeltis/triangulum
Consulté le 2026-10-09

[S2] COSEWIC - Eastern milksnake, assessment and status report (2014)
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/species-risk-public-registry/cosewic-assessments-status-reports/eastern-milksnake-2014.html
Consulté le 2026-10-09

[S3] ReptiFiles - Milksnake Care Sheet
https://reptifiles.com/milksnake-care-sheet/
Consulté le 2026-10-09

Photographie et licence

Photo : Shaun Pogacnik · CC BY 4.0
Lampropeltis triangulum 293880080.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Quelle taille de terrarium choisir pour son reptile ? Dimensions et espèces

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Fiche web : https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/serpent-lait/

Synthèse documentaire du 2026-10-09. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.