


COMPRENDRE SON ESPÈCE

Couleuvre rayée commune

Thamnophis sirtalis

Une grande partie de l’Amérique du Nord ; présence variable selon les régions, notamment en lien avec les milieux suffisamment humides. [S2] Couleuvre active utilisant milieux terrestres et proximité de l’eau ; coloration et comportements varient selon la population. [S2]

Populations variées | Jeunes vivants

TAILLE

46-137 cm

Longueur totale [S2].

LONGÉVITÉ

6-10 ans

Repère captif ; cas 20 ans [S2].

MODE DE VIE

Terre et eau

Diversité de milieux [S2].

01 Repère spécialisé

120 × 60 × 60 cm

Un adulte moyen ; plus grand selon le gabarit [S3].

02 Température & lumière

CHAUFFE	**29-32 °C [S3]**
FRAIS	**21-24 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Choix des poissons à vérifier : risque de carenceB 1 [S4].

04 L’humidité varie

40-60 %

Repère d’air spécialisé ; sol non saturé [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Déplacements

Précisions & sources

Couleuvre rayée commune

Comprendre cette fiche

Couleuvre rayée commune : populations, terrarium, alimentation variée, risque de thiaminase et reproduction vivipare, avec sources et limites explicites.

Thamnophis sirtalis réunit des populations nord-américaines très diverses. The Reptile Database reconnaît plusieurs sous-espèces, dont parietalis, concinnus et tetrataenia. [S1] La provenance et le nom complet sont donc utiles : la fiche présente l'espèce, sans transformer toutes ses couleurs et populations en un seul profil climatique.

Origine

Une grande partie de l'Amérique du Nord ; présence variable selon les régions, notamment en lien avec les milieux suffisamment humides. [S2]

Habitat complet

Herpeton propose 120 × 60 × 60 cm pour un adulte moyen, davantage pour une grande femelle ; intégrer des abris et un accès facile hors de l'eau. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Chauffe localisée : 29-32 °C selon Herpeton [S3]

Recommandation de guide spécialisé ; thermostat et contrôle indépendant.

Côté frais : 21-24 °C selon Herpeton [S3]

Une zone réellement disponible pour se soustraire à la chaleur.

Humidité de l'air : 40-60 % selon Herpeton [S3]

Maintien du sol non saturé et refuge plus humide localisé.

Repères de la première page

CHAUFFE : 29-32 °C

Herpeton [S3].

FRAIS : 21-24 °C

Herpeton [S3].

Rayures, populations et anciennes appellations

Coluber sirtalis et Eutainia sirtalis figurent parmi les anciennes combinaisons. Les sous-espèces actuelles ne sont pas automatiquement des morphes créés par sélection captive. [S1] Conserver séparément nom d'espèce, sous-espèce annoncée et nom commercial de couleur rend les échanges plus clairs. Une photo attractive sans origine ne permet pas de reconstituer cette information. Le mélange de lignées doit rester signalé plutôt que recevoir une étiquette géographique déduite de l'apparence.

Taille adulte, longévité et mode de vie

46-137 cm de longueur totale dans Animal Diversity Web ; les femelles sont généralement plus grandes que les mâles. [S2]

ADW donne 6-10 ans comme repère captif et rapporte un individu de 20 ans. Le record ne doit pas être présenté comme une moyenne. [S2]

Couleuvre active utilisant milieux terrestres et proximité de l'eau ; coloration et comportements varient selon la population. [S2]

Une couleuvre de milieux variés

ADW décrit prairies, marais, boisements et talus, souvent près d'étangs ou de ruisseaux et sous un couvert protecteur. [S2] La présence d'eau ne signifie pas que toute la surface doit être inondée. Dessiner une vraie zone terrestre, des refuges et un bassin entretenable permet d'évaluer la place restante pour circuler. Les éléments qui masquent l'animal doivent aussi rester accessibles à un contrôle nécessaire, sans supprimer toutes ses possibilités de retrait.

Faire fonctionner l'espace et le climat

Le guide Herpeton prévoit des cachettes aux deux extrémités et un bassin dont la sortie est aisée. [S3] Tester ces trajets avant l'arrivée est plus utile que multiplier les accessoires. Vérifier ensuite chaque passage de câble et chaque rainure de porte à la taille du jeune attendu. Les valeurs climatiques doivent être relevées à des endroits identifiables ; l'évolution entre journée et nuit importe autant qu'une mesure prise au centre du bac.

Composer un menu, pas seulement choisir du poisson

Herpeton décrit une rotation de proies entières comprenant notamment lombrics, rongeurs décongelés et poissons choisis pour leur faible teneur en thiaminase. [S3] Il ne faut pas convertir cette liste en assortiment arbitraire. Identifier précisément l'aliment, sa provenance et sa présentation permet de discuter le menu avec un vétérinaire. Un filet, une proie entière et un ver ne sont pas des portions nutritionnellement interchangeables à poids égal.

Comprendre le risque de carence en vitamine B 1

Le manuel vétérinaire Merck relie les carences en thiamine des serpents piscivores à des poissons riches en thiaminase ou pauvres en thiamine, y compris lorsqu'ils sont décongelés. [S4] La congélation n'est donc pas une garantie de ration adaptée. Le choix de l'espèce de poisson et la composition du menu doivent être examinés ensemble. Tremblements ou mauvaise coordination nécessitent une consultation rapide, sans diagnostiquer soi-même une carence ni improviser des doses de vitamines.

Précisions & sources

Couleuvre rayée commune

Des jeunes vivants, sans incubateur d’œufs

La femelle met au monde des jeunes vivants ; ADW indique aussi une capacité de stockage du sperme. [S2] Une femelle isolée après acquisition ne doit donc pas être supposée sans histoire reproductive. Prévoir des hébergements et des aliments adaptés avant une reproduction volontaire. Les grands rassemblements observés pendant certaines saisons ne constituent pas, à eux seuls, un protocole de cohabitation permanente pour tous les individus captifs.

Observer chaque individu

Si plusieurs animaux sont détenus, l’observation doit encore permettre de savoir lequel a mangé, mué ou changé de comportement. Un repas disparu n’est pas la preuve que chaque serpent a reçu sa part. Prévoir une solution de séparation concrète avant toute association. La vivacité ou le fait de sortir souvent ne justifie pas des manipulations répétées : privilégier les séquences à distance, où les choix de refuge et les parcours restent spontanés.

Choisir une provenance et un projet réalistes

Demander le nom complet, les conditions antérieures et une origine captive documentée. Ne pas prélever ni relâcher. La présence de plusieurs sous-espèces dans le référentiel ne garantit pas qu’elles partagent les mêmes règles de détention ou de commerce. Cette fiche n’est pas une autorisation réglementaire. Avant acquisition, vérifier les obligations correspondant à l’animal réellement proposé et prévoir les ressources nécessaires à son maintien sur plusieurs années.

Checklist avant l’arrivée

[ ] Vérifier espèce et sous-espèce.

[ ] Sécuriser portes et bassin.

[ ] Documenter précisément les aliments.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Thamnophis sirtalis
https://reptile-database.reptarium.cz/Thamnophis/sirtalis
Consulté le 2026-10-26

[S2] Animal Diversity Web - Thamnophis sirtalis
https://animaldiversity.org/accounts/Thamnophis_sirtalis/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Herpeton Academy - Common Garter Snake, Fact Sheet
https://academy.herpeton.net/en/factsheets/snakes/thamnophis-sirtalis/
Consulté le 2026-10-26

[S4] Merck Veterinary Manual - Nutritional, Metabolic, and Endocrine Diseases of Reptiles
https://www.merckvetmanual.com/exotic-and-laboratory-animals/reptiles/nutritional-metabolic-and-endocrine-diseases-of-reptiles
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Riley Stanton · CC BY-SA 4.0
Thamnophis sirtalis Stanton 4.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d’habitat.

Articles complémentaires

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Chauffage du terrarium : choisir le thermostat et vérifier le montage

Comment nourrir un serpent ? Le repas étape par étape

Quarantaine d’un nouveau reptile : préparer l’accueil et le suivi

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/thamnophis-sirtalis/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l’âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l’avis personnalisé d’un vétérinaire.