COMPRENDRE SON ESPÈCE

Tortue marginée

Testudo marginata



Grèce et Albanie ; populations introduites en Italie. [S1][S2] Diurne, surtout matin et fin de journée ; recherche l’ombre par forte chaleur. [S2]

Méditerranéenne · Herbivore

TAILLE ADULTE

Jusqu’à 35 cm

Limite indiquée par le zoo de Gdansk. [S2]

LONGÉVITÉ

21 ans : moyenne

Contexte non précisé par le zoo ; ce n’est pas un maximum. [S2]

MODE DE VIE

Diurne

Sort surtout le matin et en fin de journée. [S2]

01 Un enclos méditerranéen

Idéal : ≥ 10 m2

Par tortue selon San Pio : ombre, clôture et abri drainé. Repère extérieur à adapter au climat. [S3]

02 Température & lumière

JOUR · INTÉRIEUR	**24-27 °C [S3]**
POINT CHAUD	**≈ 32 °C [S3]**
NUIT · ACTIVE	**≈ 18 °C [S3]**

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Le zoo décrit un régime végétal riche en fibres et pauvre en protéines. [S2]

04 L’humidité varie

Abri drainé

Pas de pourcentage validé dans les sources retenues. Protéger l’abri de la pluie. [S3]

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Poids · Activité · Alimentation · Saisons

Précisions & sources

Tortue marginée

Comprendre cette fiche

Tortue marginée : enclos extérieur, taille, alimentation végétale et repères thermiques sourcés pour Testudo marginata.

Testudo marginata est une tortue méditerranéenne distincte de la tortue d'Hermann ; les plaques postérieures évasées caractérisent les grands adultes. [S1][S2]

Origine

Grèce et Albanie ; populations introduites en Italie. [S1][S2]

Mode de vie

Diurne, surtout matin et fin de journée ; recherche l'ombre par forte chaleur. [S2]

Taille adulte

Jusqu'à 35 cm selon le zoo de Gdansk ; la valeur est une limite de sa fiche, pas une moyenne adulte. [S2]

Longévité

Le zoo de Gdansk indique une moyenne de 21 ans, sans préciser le contexte ; ce chiffre n'est pas un plafond biologique. [S2]

Habitat complet

La clinique San Pio recommande idéalement au moins 10 m2 par tortue en extérieur, avec clôture sûre, ombre et abri isolé surélevé. Adapter cette proposition italienne au climat local. [S3]

Paramètres et méthode de mesure

Maintien intérieur temporaire : 24-27 °C de jour ; point chaud ≈ 32 °C. [S3]

Repères de la clinique pour surveillance ou maintien au chaud, pas température uniforme de l'enclos.

Nuit en maintien actif : ≈ 18 °C. [S3]

Ne pas confondre avec le repos hivernal.

Humidité : Aucun pourcentage de maintien établi par les sources retenues.

Abri protégé de la pluie et sol drainé, avec eau accessible. [S3]

Repères de la première page

JOUR · INTÉRIEUR : 24-27 °C

Maintien temporaire actif selon la clinique. [S3]

POINT CHAUD : ≈ 32 °C

Repère distinct de la température ambiante. [S3]

NUIT · ACTIVE : ≈ 18 °C

Ne correspond pas à l'hibernation. [S3]

Alimentation

Herbes, graminées et pousses riches en fibres composent le régime décrit par le zoo. [S2]

Saisons et cohabitation

L'hibernation demande une préparation adaptée à l'état de santé. La clinique signale aussi les blessures liées aux poursuites et accouplements ; l'espace seul ne garantit pas une cohabitation paisible. [S3]

Suivi utile

Relever les températures dans l'abri et à l'ombre, noter les sorties, les prises alimentaires et le poids. Conserver une vue d'ensemble de l'enclos à chaque réaménagement. Une fiche d'espèce ne détermine pas à elle seule si un individu peut hiberner : faire préciser la décision et le dispositif avant l'arrivée du froid.

Adapter le sol au stade

Pour les jeunes, l'éleveur décrit un substrat assez profond pour s'enfouir, avec une humidité conservée dans les refuges plutôt qu'un sol entièrement desséché. Une coupelle peu profonde complète l'installation. Ces observations sur les jeunes ne fixent pas l'humidité uniforme d'un enclos adulte. [S4]

Pour l'extérieur, la fiche privilégie un terrain drainant, des secteurs ensoleillés et des retraits ombragés. Documenter le stade et l'installation rend les mesures du carnet interprétables. [S4]

Compléments alimentaires : distinguer les situations

Chris Leone décrit de l'os de seiche à disposition et l'emploi ponctuel de calcium sans phosphore. [S4]

Portée : pratique d'élevage de Chris Leone pour Testudo marginata. Tenir compte de la composition du régime et de l'installation ; aucun dosage universel n'est fixé par cette synthèse.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Vérifier clôture et protection contre les prédateurs.

[ ] Contrôler le drainage de l'abri.

[ ] Préparer le suivi saisonnier.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Testudo marginata
https://reptile-database.reptarium.cz/Testudo/marginata
Consulté le 2026-10-09

[S2] Zoo de Gdansk - Marginated tortoise
https://zoo.gdansk.pl/en/animals/marginated-tortoise-2/
Consulté le 2026-10-09

[S3] Clinica Veterinaria San Pio - Testudo marginata
https://www.clinicaveterinariasanpio.it/uploads/CVSP_Scheda_Testudo_Marginata.pdf
Consulté le 2026-10-09

[S4] Marginated Tortoise Care Guide
https://www.hermannihaven.com/t-marginata-care-sheet
Consulté le 2026-10-29

Précisions & sources

Tortue marginée

Photographie et licence

Photo : Bouke ten Cate · CC BY 4.0
Klokschildpad - Marginated Tortoise - Testudo marginata.jpg

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Enclos extérieur pour tortue terrestre : préparer un jardin adapté

Hibernation d'une tortue : préparer la décision avec un vétérinaire

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/tortue-marginee/

Synthèse documentaire du 2026-10-29. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.