COMPRENDRE SON ESPÈCE

Uromastyx ornata

Uromastyx ornata



Mastigure de la région de la mer Rouge ; la fiche sépare données israéliennes historiques et expérience d’élevage attribuée [S1][S2][S3].

Diurne · Rupicole

TAILLE ADULTE

≈ 30-41 cm

Longueur totale dans la fiche spécifique [S4].

ACTIVITÉ

Diurne

Pentes rocheuses et oueds en Israël [S3].

RÉGIME

Herbivore

Végétaux dans les observations locales [S3].

01 Aménager son habitat

≈ 122 × 61 cm au sol

Emprise pour un individu chez Troy Jones ; pratique d’éleveur [S2].

02 Température & lumière

CHAUFFE · GUIDE JONES	49-54 °C [S2]
EXTRÉMITÉ FRAÎCHE	27-32 °C [S2]

Méthode et nuances : voir les précisions.

03 Bien nourrir

Feuillages et fleurs comestibles identifiés ; varier sans reprendre une liste de plantes sauvages à l’identique [S2][S3].

04 L’humidité varie

Non chiffrée

Milieu naturel aride ; aucun pourcentage captif validé ici [S3].

À SUIVRE DANS SQUAMATRACKER

Repas · Poids · Mues · Température · Humidité · Comportement

Précisions & sources

Uromastyx ornata

Comprendre cette fiche

Découvrir Uromastyx ornata : alimentation végétale, refuges rocheux et reproduction, avec les données de terrain séparées des pratiques d'élevage publiées.

Ce mastigure coloré fréquente les paysages rocheux arides de la région de la mer Rouge. Les observations israéliennes décrivent une utilisation fine des fissures et des ressources végétales [S1][S3].

Origine

Égypte, Israël, Arabie saoudite et Yémen selon le RDB, qui conserve ornata et philbyi comme sous-espèces [S1].

Habitat complet

Troy Jones utilise pour un individu une emprise d'environ 122 × 61 cm ; repère d'éleveur, avec plusieurs abris et un gradient utilisable [S2].

Paramètres et méthode de mesure

Zone de chauffe publiée : 49-54 °C [S2]

Conversion de 120-130 °F ; zone de basking chez Jones, pas température uniforme de l'air.

Extrémité fraîche publiée : 27-32 °C [S2]

Conversion arrondie de 80-90 °F ; pratique de l'auteur.

Humidité : Non chiffrée

Milieu naturel aride ; aucun pourcentage captif spécifique validé ici.

Repères de la première page

CHAUFFE · GUIDE JONES : 49-54 °C

Zone de basking publiée, pas air uniforme [S2].

EXTRÉMITÉ FRAÎCHE : 27-32 °C

Repère du même élevage [S2].

Noms et provenance géographique

Uromastyx ornatus et Uromastyx ocellata ornata figurent dans la synonymie ; philbyi reste inclus dans l'espèce par la base consultée [S1]. Les données de terrain utilisées ici concernent surtout Israël et ne couvrent pas uniformément toutes ces populations. Pour un animal vendu sous une désignation régionale, conserver l'information originale et demander ce qui l'étaye. Une coloration spectaculaire ne suffit pas à identifier un sexe, une sous-espèce ou une localité avec certitude.

Taille adulte, longévité et mode de vie

Environ 30-41 cm de longueur totale dans la fiche spécifique de Reptiles Magazine ; la source indique explicitement une mesure queue comprise [S4].

La fiche de Reptiles Magazine annonce 12-20 ans en captivité sans historique individuel ; estimation pratique, pas moyenne démographique vérifiée [S4].

Activité diurne entre pentes rocheuses, crevasses et zones végétalisées des oueds dans les observations israéliennes [S3].

Rochers, fissures et accès aux refuges

Le rapport de Simon Nemtzov décrit des refuges dans les pentes rocheuses des oueds et des déplacements vers les plantes du fond de vallée [S3]. Pour l'aménagement, l'intérêt de cette observation est de relier abri, exposition et nourriture. Les empilements doivent rester sûrs si l'animal pousse ou creuse autour. Prévoir des cavités inspectables évite de devoir extraire un lézard de force. L'aspect désertique du décor ne prouve pas à lui seul que ces fonctions sont disponibles.

Chauffer une zone, laisser un choix

Les températures publiées par Troy Jones décrivent son élevage, dans une pièce contenant de nombreuses installations [S2]. Elles sont attribuées à cette pratique et ne sont pas présentées comme le résultat d'un essai physiologique. Avant utilisation, préciser la méthode et l'endroit de mesure du support exposé. Vérifier aussi les retraits pendant la période la plus chaude. La puissance inscrite sur une lampe ne permet pas de déduire la température obtenue, ni l'exposition aux UVB au niveau du dos.

Humidité et eau : éviter une règle absolue

Les observations israéliennes portent sur un milieu extrêmement aride, mais distinguent les espaces ouverts des crevasses utilisées comme abris [S3]. Les deux textes d'élevage minimisent le recours à une coupelle [S2][S4] ; ils n'établissent pas pour autant qu'un animal ne puisse jamais avoir besoin d'eau accessible. Aucun pourcentage précis n'est retenu ici. Un projet doit décrire comment l'hydratation sera surveillée et comment intervenir avec un vétérinaire si l'état se dégrade, sans attendre un signe spectaculaire.

Construire un menu végétal identifiable

Le rapport de terrain cite feuilles, fleurs et fruits d'Ochradenus baccatus et d'autres arbustes [S3]. Il soutient une alimentation végétale sans transformer les plantes locales en liste d'achats obligatoire. Jones propose en captivité des feuillages et fleurs comestibles variés [S2]. Identifier chaque plante, son origine et l'absence de traitements évite les substitutions approximatives. La couleur ou le caractère « naturel » d'une fleur ne garantit pas sa comestibilité. Les compléments se raisonnent avec le menu et l'exposition lumineuse.

Comportement et précautions de groupe

Le rapport israélien décrit poursuites entre mâles et partage partiel d'espaces, avec une organisation plus nuancée qu'un simple couple permanent [S3]. Jones rapporte lui aussi des associations qui finissent par nécessiter une séparation [S2]. Pour un entretien individuel, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter un congénère pour reproduire une image de groupe. Une interaction brusque doit être décrite par ses conséquences : fuite, blessure, accès bloqué ou repas manqué. Elle ne devient pas anodine parce qu'elle existe dans la nature.

Précisions & sources

Uromastyx ornata

Reproduction : distinguer terrain et élevage

Dans la population israélienne rapportée, les femelles creusent un site de ponte au fond des oueds ; les observations mentionnent 7-17 œufs et des éclosions environ deux mois plus tard [S3]. Ces durées naturelles ne donnent pas une température d'incubateur. Jones décrit séparément sa reproduction captive et les risques d'interactions violentes [S2]. Préparer un projet demande donc une installation de ponte, une solution de séparation et un suivi des femelles ; aucun calendrier automatique de refroidissement n'est imposé.

Suivi et portée des sources

La durée captive publiée dans l'ancienne fiche de Reptiles Magazine n'est pas accompagnée d'une cohorte documentée [S4]. Les observations de terrain du rapport sont historiques et locales ; leurs estimations de population ou mentions réglementaires ne sont pas actualisées ici. Garder l'historique de masse, la consommation de végétaux et l'utilisation des refuges permet de comparer des périodes semblables. Un changement durable doit être examiné avec les mesures réelles du terrarium, plutôt qu'expliqué uniquement par une étiquette d'espèce désertique.

Checklist avant l'arrivée

[ ] Conserver l'identité et la provenance de l'animal.

[ ] Préparer des zones exposées et des refuges mesurables.

[ ] Suivre individuellement repas, masse et comportement.

Sources consultées

[S1] The Reptile Database - Uromastyx ornata
https://reptile-database.reptarium.cz/Uromastyx/ornata
Consulté le 2026-10-26

[S2] Troy Jones - Ornate Uromastyx Care and Breeding Tips
https://reptilesmagazine.com/ornate-uromastyx-care-and-breeding-tips/
Consulté le 2026-10-26

[S3] Simon C. Nemtzov - Uromastyx lizards in Israel, NDF Workshop WG7, case study 5
https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/planeta/cites/files/GT7_Reptiles_Amphibians.pdf
Consulté le 2026-10-26

[S4] Reptiles Magazine - Ornate Uromastyx, fiche spécifique
https://reptilesmagazine.com/wp/old/listings/lizard-species/ornate-uromastyx.html
Consulté le 2026-10-26

Photographie et licence

Photo : Mickey Samuni-Blank · CC BY-SA 3.0
Uromastyx ornata.JPG

Photo réelle recadrée pour la mise en page. Le décor photographié ne constitue pas une recommandation d'habitat.

Articles complémentaires

Température et hygrométrie du terrarium : mesurer aux bons endroits

Calcium et UVB chez les reptiles : comprendre leur rôle sans improviser les doses

Aménager un terrarium : organiser le sol, les refuges et la hauteur

Suivi du poids d'un reptile : mesurer, comparer et transmettre

Fiche web :
https://www.squamatracker.fr/encyclopedie/uromastyx-ornata/

Synthèse documentaire du 2026-10-26. Adapter les repères à l'âge, à la santé, à la provenance et aux mesures. Ce document ne remplace ni un diagnostic ni l'avis personnalisé d'un vétérinaire.